

УДК 549.324.35, 552.18 (571.53/55), 550.42, 552.311

ПЕТРОЛОГИЯ, ГЕОХИМИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ СУЛЬФИДОНОСНЫХ И ЭПГ-МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ТРОКТОЛИТОВ ИЗ ЗОНЫ КОННИКОВА В ЙОКО-ДОВЫРЕНСКОМ РАССЛОЕННОМ ИНТРУЗИВЕ

© А.А. Арискин^{1,2}, Л.В. Данюшевский³, М. Фиорентини⁴, Г.С. Николаев²,
Е.В. Кислов^{5,6}, И.В. Пшеницын^{1,2}, В.О. Япаскурт¹, С.Н. Соболев¹

¹ *Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 119234 Москва, Ленинские горы, 1, Россия; e-mail: ariskin@rambler.ru*

² *Институт геохимии и аналитической химии им. В.И.Вернадского РАН 119991 Москва, ул. Косыгина 19, Россия*

³ *Центр исследований рудных месторождений (CODES), Тасманийский университет, Хобарт, Австралия*

⁴ *Центр методов поиска рудных месторождений, Кафедра Земли и окружающей среды, Ведущий ARC центр изучения флюидных систем от ядра до коры, Университет Западной Австралии, Перт, Австралия*

⁵ *Геологический институт СО РАН, 670047 Улан-Удэ, ул. Сахьяновой 6, Россия*

⁶ *Бурятский государственный университет, 670000 Улан-Удэ, ул. Смолина, 24 "а", Россия*

PETROLOGY, GEOCHEMISTRY AND THE ORIGIN OF SULFIDE-BEARING AND PGE-MINERALIZED TROCTOLITES FROM THE KONNIKOV ZONE IN THE YOKO-DOVYREN LAYERED INTRUSION

A.A. Ariskin^{1,2}, L.V. Danyushevsky³, M.L. Fiorentini⁴, G.S. Nikolaev², E.V. Kislov^{5,6},
I.V. Pshenitsyn^{1,2}, V.O. Yapaskurt¹, S.N. Sobolev¹

¹ *Faculty of Geology, Moscow State University, Leninskie Gory 1, 119234, Moscow, Russia*

² *Vernadsky Institute, Kosygin Str. 19, 119991, Moscow, Russia*

³ *CODES CoE and Earth Sciences, University of Tasmania, Private Bag 79, Hobart, TAS 7001, Australia*

⁴ *Centre for Exploration Targeting, School of Earth and Environment, ARC Centre of Excellence for Core to Crust Fluid Systems, The University of Western Australia, 35 Stirling Highway, 6009 Crawley, Perth, Western Australia, Australia*

⁵ *Geological Institute, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, ul. Sakh'yarovoi 6a, Ulan-Ude, 670047, Russia*

⁶ *Buryatian State University, 670000 Ulan-Ude, Smolina st., 24 "a", Russia*

АННОТАЦИЯ

Впервые представлено подробное описание обнажений, структуры, минералогии и состава необычных сульфидоносных троктолитов из Йоко-Довыренского расслоенного массива в Северном Прибайкалье (Россия). Этот участок разреза (названный Зоной Конникова) характеризуется проявлениями пегматоидных пойкилитовых сульфидов и рассеянной сульфидной вкрапленности с разнообразной ЭПГ-минерализацией. В составе первых преобладают пирротин-троилитовые продукты распада моносльфидного твердого раствора (Mss), для вторых – ассоциации кубанита и халькопирита, производные от “промежуточного Ni-Cu-Fe раствора” (Iss). Положительные ковариации содержаний серы и халькогенов (Se, Te), а также сублинейный характер зависимости концентраций Pd, Pt, Au и Cu от теллура указывают на сульфидный контроль распределения этих элементов в троктолитовых кумулатах. При нормировке их концентраций в породах на сульфидную массу, средние составы “100%-сульфидов” в образцах подразделяется на две группы – резко обедненные платиноидами, Au, Cu и Te, и в 10-50 раз обогащенные. Причем такое деление согласуется с морфологическими и минералогическими различиями. Генетическое значение имеет тот факт, что составы Mss-ассоциаций несколько беднее платиноидами и Te по сравнению с примитивными сульфидами из базальной зоны Довырена; составы с преобладанием сульфидов меди заметно богаче. Этот вывод подкреплен данными LA-ICP-MS исследований микроэлементного состава сульфидных фаз. Установленные особенности указывают на ограниченные масштабы фракционирования несмесимых сульфидов по мере затвердевания троктолитовых кумулатов. Тогда как формирование богатых ЭПГ и Te ассоциаций можно связать с последовательностью кристаллизации сульфидного прекурсора, близкого наиболее примитивной жидкости. Это согласуется с известными законами кристаллизации сульфидных систем, в том числе, объясняя аномально высокие отношения S/Te в богатых продуктами Mss пегматоидных троктолитах. Таким образом, в качестве агента, транспортирующего благородные металлы и халькогены в толще троктолитовых кумулатов выступали сульфидные расплавы. Этот вывод требует конкретизации физических механизмов и характеристик кумулусной среды (реология, проницаемость, смачиваемость сульфидом разных фаз и т.д.), в которой возможны пространственное разделение моносльфидного раствора и богатых ЭПГ более медистых фракций с их последующей инфильтрацией и отложением на границах критически низкой проницаемости.

Ключевые слова: Довырен, сульфидоносный троктолит, Mss, Iss, ЭПГ-минерализация, благородные металлы, фракционирование Se и Te, обособление сульфидов, инфильтрация, аккумуляция

ВВЕДЕНИЕ

Йоко-Довыренский интрузив расположен в 60 км северо-восточнее оконечности оз. Байкал (Северное Прибайкалье, Россия), залегает среди карбонатно-терригенных (преимущественно черносланцевых) толщ Сыннырского рифта (Конников, 1986; Рыцк и др., 2002) и входит в состав Сыннырско-Довыренского вулканоплутонического комплекса, возрастом 724-728 млн. лет (Арискин и др., 2013; Ernst et al., 2016). Помимо главного расслоенного массива протяженностью ~26 км, к нему относятся подстилающие габбро-перидотитовые силлы и дайки лейкократовых габброноритов (Кислов, 1998; Орсоев и др., 2018; Ariskin et al., 2018b). Эти интрузивные и субвулканические тела перекрываются эффузивными образованиями Сыннырского хребта, включающими высоко-Ti базальты иняптукской свиты и низко-Ti анедизитобазальты сыннырской свиты (Мануйлова, Зарубин, 1981). Изотопно-геохимические данные указывают на генетическое родство интрузивных и вулканических пород низко-Ti серии (Арискин и др., 2015a).

Довырен имеет близкое к вертикальному падение, что позволяет проводить реконструкции его стратиграфических разрезов в первичном субгоризонтальном залегании – путем опробования поверхностных обнажений вкрест простирания интрузива. Строение массива детально изучено в наиболее мощной центральной части (3.2-3.4 км), в районе руч. Большой и Центральный (Кислов, 1998; Ariskin et al., 2018b), рис. 1. В основании разреза здесь выделяются породы эндоконтакта (закаленные габбронориты и пикродолериты, выше - плагиоклазовые лерцолиты), переходящие в главную стратиграфическую последовательность пяти зон, отвечающих (снизу вверх) изменению кумулусных ассоциаций: дунит ($Ol+Chr$) → троктолит ($Ol+Pl+Chr$) → оливинное габбро ($Pl+Ol+Cpx\pm Chr$) → оливинный габбронорит ($Pl+Ol+Cpx\pm Opx$) → кварцевые габбронориты и пижонит-содержащие габбро ($Pl+Cpx\pm Opx\pm Pig$), рис. 2 (слева). В прикровельной части массива распространены габбро-пегматиты и кварцевые гранофиры. Зона верхнего контакта сложена мелкозернистыми габброноритами.

Интерес к проблемам сульфидообразования и рудному потенциалу Довыренского интрузивного комплекса обусловлен наличием Cu-Ni сульфидных руд в подстилающих силлах и основании плутона (Гурулев, 1965; Конников, 1986), а также присутствием существенно полевошпатовых пород (вплоть до анортозитов) с участками малосульфидной минерализации, богатой элементами платиновой группы (ЭПГ) – так называемый Главный Риф или Риф I (Дистлер, Степин, 1992; Орсоев и др., 1995; Кислов, 1998; Konnikov et al., 2000), см. рис. 2. Долгие годы внимание специалистов было

сфокусировано на изучении составов пород и поведения ЭПГ-минерализации именно Главного Рифа, который в действительности представляет горизонт (мощностью около 150 м), примыкающий к условной границе между троктолитами и оливиновыми габбро. Эта размытость стратиграфического контакта проявляется в виде незакономерного переслаивания разной меланократовости троктолитов и оливиновых габбро с многочисленными шлирами и прослоями анортозитов, нередко ассоциирующих с габбропегматитами. Обогащение ЭПГ в отдельных анортозитовых шлирах явилось основанием называть эту зону Критической – по аналогии с известными горизонтами в Бушвельдском интрузиве (Толстых и др., 2008; Орсов, 2019). Однако аналогии на этом заканчиваются, а пироксенитов и тонких прослоев хромититов, как важных компонентов бушвельдских пород, в разрезах Довырена не наблюдается. Более важным представляется тот факт, что структурная позиция пироксеновых фаз во всех типах переходных пород указывает на его интеркумулусную природу, что позволяет рассматривать ассоциацию пород этой зоны как оливин-плагиоклазовые кумулаты с варьирующими пропорциями оливина, плагиоклаза и продуктов кристаллизации интеркумулусного расплава (Ariskin et al., 2018b).

В ходе полевых работ на Довырене нами впервые установлена малосульфидная, местами благороднометальная, минерализация в нижней половине троктолитовой зоны, в стратиграфическом интервале примерно от 40 до 480 м выше отмытого контакта с дунитами (Арискин и др., 2015б). Породы этого участка разреза (который назван “Зоной Конникова”, см. ниже) заметно отличаются от платиноносных анортозитов и лейкогабброидов Главного Рифа не только по валовому составу, но также морфологии сульфидных скоплений, наличию пегматоидных сульфидов, микроэлементному составу сульфидных фаз и особенностям состава минералов для элементов платиновой группы (МПП). Это явилось основанием для выделения сульфидоносных троктолитов в самостоятельный генетический тип малосульфидной минерализации, который, вероятно, представляет важный элемент истории сульфидов в довыренской камере, сопряженной с переносом и концентрированием благородных металлов в толще кристаллизующихся троктолитовых кумулатов (Ariskin et al., 2018b).

Первая находка сульфидоносных троктолитов имела место в 2007 г. в верховьях руч. Центральный, примерно в 100 м выше стратиграфического контакта дунитов и троктолитовой зоны (рис. 1). Среди курумных развалов здесь обнаружен крупный блок троктолита с гнездами сульфидной минерализации; авторы находки – Йонас Мотта-и-Силва (Jenus Motta-e-Silva, Brazilia) и Е.В. Кислов. Один из образцов (07DV403-1)

содержал сфероидное включение размером около 3 см, представленное оливин-плагиоклазовой матрицей с фрагментарными вкраплениями сульфидов в интерстициях между зернами породообразующих минералов. На аншлифах образца было видно, что включение округлое – с субмиллиметровым ореолом более редких рассеянных сульфидов. В 2010 г. при проведении LA-ICP-MS исследований микроэлементного состава сульфидных фаз в породах Довырена в этом образце Э.Г. Конников с коллегами обнаружили высокие содержания Pd в пентландите (91 ± 84 ppm, $n=7$) при максимальной концентрации до 250 ppm¹. Эти значения близки среднему содержанию Pd в пентландите из анортозитов Главного Рифа Довырена (235 ± 84 ppm, $n=10$), см. Арискин и др. (2015б).

Последующие исследования обр. 07DV403-1 при помощи методов электронной микроскопии в Тасманийском университете (г. Хобарт, Австралия) позволили идентифицировать 12 зерен мончеита Pt(Te,Vi)₂ и майчнерита PdBiTe размером от 1 до 9 мкм – с примерно равными пропорциями Vi и Te; одно зерно отвечало родиевому мончеиту с содержанием 6 мас.% Rh. Кроме того, обнаружены два зерна Ag-Au фаз размером 1 и 8 мкм. Все они приурочены к сульфидным интерстициям между зернами кумулусного оливина и пойкилитоидного плагиоклаза. В наиболее свежих, незатронутых вторичными изменениями фрагментах породы, наблюдались ортомагматические соотношения оливина, плагиоклаза и сульфидов (см. изображение шлифа на врезке рис. 2), представленных ассоциацией пирротина, пентландита, халькопирита и кубанита – как продуктов кристаллизации богатых медью сульфидных растворов. Эти наблюдения указывали на определенную аналогию с ЭПГ-минерализацией Главного Рифа (Орсоев и др., 1995; Толстых и др., 2008), тем более что средний минеральный состав сульфидных вкраплений в троктолитах (оцененный посредством Mineral Liberation Analysis, MLA) оказался близок сульфидам из платиноносных анортозитов – свыше 70% кубанита и халькопирита (Ariskin et al., 2018b).

В результате была поставлена задача поиска коренных обнажений сульфидоносных пород в нижней части троктолитовой зоны и сбора представительных образцов для последующего изучения. В данной статье приводится обобщение данных по образцам из Зоны Конникова, включая минералогические и геохимические характеристики пород, особенности состава сульфидов и разнообразия минералов ЭПГ. В заключительной части рассмотрены возможные генетические соотношения между бедными и богатыми платиноидами ассоциациями.

¹ С учетом данного факта и многолетних исследований Э.Г. Конниковым (1935-2011) Йоко-Довыренского массива мы назвали эту часть разреза “Зоной Конникова”.

Аналитические исследования включали изучение составов породообразующих минералов, сульфидных фаз и минералов платиновой группы, а также определение валовых составов пород.

Микрозондовый анализ проводился в Центральной научной лаборатории Тасманийского университета (Хобарт, Австралия) и лаборатории локальных методов исследования вещества кафедры петрологии геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва, Россия). В первой применялся электронный микроанализатор Cameca SX-100 EPMA с пятью волновыми спектрометрами и энергодисперсионной приставкой Bruker, во второй – электронный микроскоп JSM-6480LV с вольфрамовым термоэмиссионным катодом, оснащенный энергодисперсионным спектрометром X-Max-N50 (“Oxford Instruments”, Великобритания). Стандарты и образцы измерялись в режиме сфокусированного зонда: в Тасмании при ускоряющем напряжении 15 кВ, силе тока на зонде 20 нА и размере электронного пучка 5 мкм (для оливина и шпинели 15 кВ, 30 нА и 2 мкм); в МГУ – все минералы при 20 кВ и 10 нА. В качестве эталонов в Тасмании использовались международные стандарты USNM 115900 (плагиоклаз LPL), USNM 122142 (авгит KANZ), APAT, HORN, USNM 111312/444 (оливин San Carlos) и USNM 117075 (хромит из Новой Каледонии), см. Jarosewich et al. (1980). При работе на кафедре петрологии в МГУ применялись стандарты металлов, стехиометричных оксидов и сульфидов. Точность измерения содержания главных элементов варьировала в интервале 0.5-2 отн. %.

На начальном этапе диагностики минералов ЭПГ, золота и серебра в Центральной научной лаборатории Тасманийского университета (UTAS, 2010-2014 гг.) использовался автоэлектронный эмиссионный микроскоп Hitachi SU-70 FESEM ультравысокого разрешения, который позволяет визуализировать детали поверхности образца нанометрового масштаба. На этом приборе получены первые составы и изучена зональность крупных зерен минералов ЭПГ – при помощи сопряженного с Hitachi SU-70 энергодисперсионного спектрометра X-Max 80.

Концентрации Fe, Ni, Cu, Co, Se, Te, Zn, Mo, Ag, Cd, Sb, Pb, Rh, Os, Ir, Ru, Rh, Pt, Pd, Re и Au в сульфидах были определены методом масс-спектрометрии индуктивно-связанной плазмы при лазерной абляции препаратов (LA-ICP-MS) в Школе физических наук и Центре исследований рудных месторождений при Тасманийском университете (CODES, г. Хобарт, Австралия). Аналитическое оборудование включало два микрозонда с лазерной абляцией: YAG (New Wave Research) и ASI RESOLUTION S-155 (на котором

используются 193-nm эксимерный лазер Coherent CompexPro), совмещенные с квадрупольным масс-спектрометром Agilent 7700s. Размер лазерного пучка составлял 22-40 μm при частоте импульсов 5 Hz в атмосфере чистого гелия. Детали стандартов, поправок на интерференцию отдельных элементов и программного обеспечения см. в (Ariskin et al., 2016; Ariskin et al., 2018b).

Валовые составы пород (включая ЭПГ) были изучены в лаб. GEOLABS в г. Садбери (Онтарио, Канада), см. www.mndm.gov.on.ca/sites/default/files/2017_geo_labs_brochure.pdf). Содержания главных элементов, Cu, Ni и Co получены по стандартным методикам XRF-анализа. Золото, серебро, селен и теллур определялись методом ультрамикроразноэлементного ICP-MS анализа после гидролитического разложения проб в царской водке; чувствительность анализа варьировала в пределах: Au – 0.4 ppb; Ag – 2-10 ppb, Se – 0.04-0.1 ppm, Te – 0.01-0.02 ppm. Концентрации Ir, Ru, Rh, Pt и Pd определялись методом ICP-MS в продуктах пробирной экстракции; пределы обнаружения составляли для Ir – 0.01, Ru – 0.08, Rh – 0.04, Pd – 0.12 и Pt – 0.17 ppb.

Оценки относительных пропорций сульфидных фаз в образцах (Pn/Po/Сру/Cub) получены посредством автоматизированной идентификации минералов на сканирующем электронном микроскопе FEI Quanta 600, оснащенный энергодисперсионным спектрометром EDAX Sapphire SUTW Si(Li), при помощи пакета программ “Mineral Liberation Analyzer” (MLA). При этом использовались две методики - XMOD_STD и SPL_Lt, обеспечивающие “рамочное” разрешение при площадном сканировании локальных участков размером порядка 12 μm^2 и $\sim 3 \mu\text{m}^2$, соответственно (Ariskin et al., 2016). Измерения проводились на полированных шашках диаметром 1 дюйм. В случае площадного опробования посредством XMOD_STD такой размер давал порядка 10000 спектров минералов, что позволяло получить надежную оценку “среднего состава сульфида” даже в случае убогой минерализации при валовых содержаниях серы <0.1 мас.%. Относительные пропорции Pn, Po, Сру и Cub рассчитывались путем нормирования соответствующих площадей или числа “попаданий” в конкретную минеральную фазу.

ПЕТРОГРАФИЯ И МИНЕРАЛОГИЯ СУЛЬФИДОНОСНЫХ ТРОКТОЛИТОВ

Отбор образцов. В полевой сезон 2013 г. был проведен поиск коренных обнажений и новых образцов минерализованных троктолитов в верховьях руч. Центральный, вкрест простирацию массива – в пределах полосы шириной порядка 200 м, параллельно бровкам обоих склонов ручья (рис. 1). На стратиграфическом уровне несколько выше находки обр. 07DV403-1 были обнаружены коренные выходы троктолитов с гнездами рассеянных

сульфидов (см. правую фотографию на рис. 2). Недалеко от первой находки (точка 13DV551 на рис. 2) установлена еще одна глыба троктолита размером до 40 см в поперечнике, содержащая округлые гнезда сульфидов, диаметром от 1 до 3 см. Здесь было отобрано несколько штуфов (13DV551-1, -2, -3), но наибольший интерес представляла угловатая глыба размером примерно 10×15×50 см, которая распалась на несколько фрагментов, содержащих прожилки пегматоидных сульфидов мощностью до 1 см. Из нее было отобрано несколько штуфов, самый крупный из которых (13DV551-4а) показан на рис. 3а. На срезах этого образца (рис. 3б) и демонстрационном аншлифе (рис. 3в) хорошо видны пегматоидные зерна оливина и плагиоклаза с аномально крупными ксеноморфными выделениями сульфидов в межзерновом пространстве. Это первая находка сульфидоносных пегматоидных троктолитов на Довырене.

Другое коренное обнажение было обнаружено в истоке руч. Центральной, среди скальных выходов под гривкой склона, на расстоянии около 460 м выше контакта троктолитов с дунитами (точка 13DV554 на рис. 2). Непосредственно в обнажении был отобран образец 13DV554-4 (табл. 1), а среди обломков пород в основании этих выходов были обнаружены фрагменты шлиров и обособлений гетерогенного материала (Ol+Pl+сульфид) размером до 5-10 см. Один из таких обломков (13DV554-1) содержал фрагмент относительно крупного шлира диаметром ~5 см, из которого было сделано 12 аншлифов. Два из них, представляющие противоположные части этого гетерогенного образования (препараты 13DV554-1-3 и -12) были изучены детально, см. ниже данные о сульфидных фазах и минералах ЭПГ. В сезоне 2015 г. эти материалы были дополнены образцами с убогой минерализацией, отобранных в нижней части Зоны Конникова (D8/15, D9/15, D10/15, D11/15 и D12/15), табл. 1.

Петрография. Подобно обычным троктолитам, их сульфидоносные разновидности представлены массивными среднезернистыми породами, аллотриоморфнозернистой структуры (рис. 4аб). Степень идиоморфизма и средний размер зерен выше у оливина, который преобладает над плагиоклазом (табл. 1); количество клинопироксена не превышает 1.5-2%. Единственное исключение – лейкотроктолит D12/15, в котором количество плагиоклаза достигает 60% (табл. 1). Доминирование оливина не согласуются с равновесными пропорциями кристаллизации на Ol-Pl котектиках (~70% Pl и 30% Ol), что подчеркивает первично-кумуляную природу оливина и кристаллизацию основной массы плагиоклаза *in situ* – в исходном протооливиновом кумулате. Мизерные количества клинопироксена (проявленного в виде редких интерстиций и тончайших каемок вокруг зерен оливина) указывают на то, что интеркумуляусный расплав практически полностью

“покинул” этот исходный кумулат, очевидно после того, как прошла частичная котектическая кристаллизация плагиоклаза и оливина. Это согласуется с аномально низкими содержаниями несовместимых элементов и сублинейными трендами составов троктолитов на тройных петрохимических диаграммах, которые отвечают биминеральной смеси кристаллов оливина и плагиоклаза, см. рис. 15 в (Ariskin et al., 2018b).

Повышенное количество плагиоклаза коррелируют с проявлениями слоистости (“foliation”) в отдельных шлифах (рис. 4б), которую можно рассматривать как следствие деформации первичных кумулатов, вероятно в процессе их усадки, докристаллизации и отгонки остаточного расплава (Holness et al., 2017). При полевых и текстурных исследованиях проглядывает приуроченность сульфидной минерализации к более лейкократовым участкам троктолитов, однако для полного подтверждения этот вывод требует более детальных исследований. Интересен факт, что редкие каемки пироксена проявлены чаще на границах зерен кумулузного оливина и сульфидных фаз.

Составы оливина и плагиоклаза в сульфидоносных и неминерализованных троктолитах меняются в узких пределах – обычно 83-85% Fo и 86-88% An (табл. 1). Алюмохромистая шпинель содержит 10-13 мас.% Al_2O_3 и 36-40 мас.% Cr_2O_3 , при этом магниальность шпинелида $mg\#Mg/(Mg+Fe^{2+})$ варьирует около 0.24. Такое постоянство состава минералов оставляет мало сомнений, что отличия в лейкократовости троктолитов связаны с разной степенью накопления кумулузного оливина, равновесного с котектическим плагиоклазом и расплавом.

Минералогия сульфидных фаз. Для троктолитов из Зоны Конникова характерны два структурно-морфологических типа сульфидных ассоциаций: (1) рассеянная, местами микросидеронитовая², вкрапленность в сульфидоносных шлифах и (2) пегматоидные выделения ксеноморфных зерен. Оценки среднего минерального состава методом MLA показывают, что в первом случае распространены ассоциации с преобладанием сульфидов меди, во втором доминируют Fe-Ni фазы с соотношением $(Po\pm Tr):Pn\sim 2:1$ (табл. 2). Во всех случаях кубанит преобладает над халькопиритом. Один образец из нижней части Зоны Конникова (13DV551-2-2) имеет промежуточные характеристики. Структурные исследования с привлечением микронзондового анализа указывают на то, что рассеянные

² Термин “микросидеронитовая” используется применительно к локализованным участкам шлифов и аншлифов с максимальным содержанием рассеянных сульфидов, распределение которых позволяет предполагать локально связанный характер сульфидного материала в масштабе нескольких миллиметров, см. рис. 4б.

сульфиды в большинстве представлены продуктами кристаллизации обогащённых медью сульфидных жидкостей, состав которых вероятно близок к составу высокотемпературных кубических сульфидных Ni-Cu-Fe твёрдых растворов Iss1 и Iss2³. Для обоих характерны пластинчатые структуры распада, образованные троилитом и Fe-пирротинном – как результат превращения высоко-Т твёрдого пирротинового раствора (рис. 5аб).

В пирротине и кубаните нередко тонкие ламеллы распада пентландита. Менее распространены поздние генерации кубических сульфидных растворов – Iss3 и Iss4, которые всё более богаты Cu и бедны Fe. Для этих ассоциаций характерны скопления мелких ламелл и обособления пентландита, которые тяготеют к выделениям халькопирита в сростаниях троилита и пирротина (рис. 5в). Крайне редко встречаются зерна, отвечающие позднему низкотемпературному раствору – Iss5, структурным признаком которого являются решетчатые сростания халькопирита с талнахитом $Cu_9Fe_8S_{16}$ и крупные обособления пентландита (рис. 5г). В кристаллах халькопирита нередко двойники полиморфного перехода кубический → тетрагональный. Для этой ассоциации характерно присутствие мелких зерен сфалерита и мельчайших (часто изометричных) выделений галенита, размером редко более 5 микрон. Среди микросидеронитовых вкраплений только изредка встречаются редкие мелкие кристаллы высоко-Т гексагонального Ni-Fe твёрдого раствора, вероятно Mss1.

³ Описание твердых сульфидных растворов дается в генетической последовательности (от ранних к поздним), установленной по результатам изучения рудоносных пород Норильского района и подтвержденных наблюдениями для сульфидоносных пород Довырена (Спиридонов, 2010; Спиридонов и др., 2019аб): Mss1 (в виде сростаний троилита, железистого пирротина и пентландита) → Mss2 (Tr+Pn+Po, в подчинённом количестве Cru) → Iss1 (Tr+Cub с включениями Pn) → Iss2 (решётчатые сростания Cru+Cub с включениями железистого Po и Pn) → Iss3 с характерными структурами распада кубанит (матрица) – халькопирит (ламеллы) → Iss4 (двухстадийные структуры распада – кубанит в халькопиритовой матрице) → Iss5 (пластинчатые сростания халькопирита и талнахита, пентландит, кубанита нет), см. пояснения к фотографиям на рис. 5. Однозначная идентификация первичных структур распада Mss и Iss осложнена процессом отжига сульфидов в ходе длительной истории затвердевания Йоко-Довыренского интрузива (Ariskin et al., 2018b), в результате которого большинство сульфидных зерен перекристаллизованы и превращены в зернистые сростания троилита, пирротина, кубанита, пентландита и халькопирита (рис. 6).

Для пегматоидных прожилков троктолитов в низах Зоны Конникова характерны крупные ксеноморфные выделения сульфидов, соразмерные с кристаллами оливина и плагиоклаза, которые в поперечнике достигают 5-6 мм. Сульфидные фазы выполняют пространство между зернами силикатов, образуя подобие пойкилитовой матрицы. Их фазовый состав заметно отличается от богатых сульфидами меди шпиров (табл. 2, рис. 5). Это выражается в резком преобладании пирротина, который ассоциирует с пентландитом и кубанитом; только изредка встречается троилит. По сравнению с другими минерализованными троктолитами, сульфиды изменены здесь сильнее – часто встречается макинавит $(\text{Fe,Ni})_9\text{S}_8$ (тетрагональный) и виоларит $(\text{FeNi}_2\text{S}_4)$, реже пирит. Находки “свежего” пирротина и пентландита редки. Все эти сульфидные фазы встречаются в тесной ассоциации, относительно равномерно распределены по гнездам сульфидов и пегматоидным прожилкам (рис. 6аб). Размер отдельных зерен пирротина достигает нескольких мм. Несмотря на то, что типичных змеобразных структур распада Mss на железистый пирротин и троилит здесь не наблюдается, мы рассматриваем данную ассоциацию как продукт распада высокотемпературного гексагонального никель-железистого раствора. Поиск реликтовых первичных структур для более точной спецификации на Mss1 или Mss2 затруднен – частично из-за крупного размера сульфидных зерен в отдельных аншлифах, но в большей мере из-за их полной перекристаллизации в процессе длительного отжига.

Минералы элементов платиновой группы (МПГ) в троктолитах представлены ассоциациями, характерными для малосульфидной минерализации других рудоносных интрузивов, напр. (Godel et al., 2007; Oberthür, 2011; O’Driscoll, González-Jiménez, 2016). Преобладают теллуриды и висмутотеллуриды Pt и Pd, реже проявлены их станниды и плюмбиды, а также ассоциирующие с ними алтаит PbTe и минералы Au-Ag. Среди станнидов Pd (\pm Pt) чаще встречается паоловит Pd_2Sn , реже атоцит Pd_3Sn . Установлено присутствие неидентифицированного станнида с отношением $\text{Pd}:\text{Pt}\sim 2$. Из других относительно распространенных минералов палладия отметим звягинцевит Pd_3Pb и потарит PdHg , обнаруженный в верхах Зоны Конникова (рис. 7г). Подобная “ртутная специализация” этой части разреза коррелирует с присутствием Hg-содержащих МПГ в анортозитах из Главного Рифа (табл. 3) и является уникальной особенностью платинометальной минерализации Йоко-Довыренского массива (Спиридонов и др., 2019аб). Сперрилит PtAs_2 крайне редок; в троктолитах установлено только несколько зерен размером < 5 мкм. Низкое содержание сперрилита – также характерная особенность ЭПГ-минерализованных и рудоносных пород Довырена (Толстых и др., 2008). В участках,

подвергнутых вторичным изменениям, нередко присутствие низкотемпературных, вероятно позднеметасоматических, выделений минералов серебра – в виде низкой пробности электрума, самородного серебра, аргентита Ag_2S и гессита Ag_2Te . Они слагают вросстки и микропрожилки в сульфидах и в силикатной матрице, размером не более 3-5 мкм.

Морфология и распределение МПГ по типам сульфидной минерализации неоднородно.

В сульфидоносных шлирах из Верхней части зоны Конникова наиболее крупные зерна размером $>5-10$ мкм приурочены к контактам Ni-Cu-Fe сульфидных зерен с силикатами (рис. 7б-д). Выделения меньшего размера встречаются внутри сульфидных фаз или в виде вростков в силикатной матрице, чаще представленной продуктами вторичных изменений оливина и плагиоклаза (Спиридонов и др., 2019а) – на некотором удалении (десятки до сотни мкм) от сульфидов (рис. 7а). Самый распространённый минерал ЭПГ в этих троктолитах – мончеит $\text{Pt}(\text{Te},\text{Bi})_2$, который обычно образует обособления неправильной формы, часто в сростаниях с котульскитом $\text{Pd}(\text{Te},\text{Bi})$ (рис. 7а) и теларгпалитом $(\text{Pd}, \text{Ag})_3\text{Te}$ (рис. 7в-д), реже с пентландитом (рис. 7б) и алтаитом. В аншлифах обр. 13DV554-1 размер выделений мончеита достигает 30 мкм, но обычно <10 мкм. Состав мончеита варьирует от почти стехиометричного бителлурида платины PtTe_2 до сложного бивисмутотеллурида с атомным отношением $\text{Te}:\text{Bi}$ около 13. Особенность состава мончеита в том, что в структуре минерала теллур часто замещён не только висмутом, а также свинцом и даже ртутью (Спиридонов и др., 2019а), табл. 3. Содержания обоих элементов могут достигать 10-12 мас.%. Иногда с мончеитом ассоциирует дивисмутид платины – инсизваит (PtBi_2).

Второй по распространённости минерал ЭПГ – котульскит $\text{Pd}(\text{Te}, \text{Bi}, \text{Pb})$ – представлен выделениями и сростаниями с мончеитом, реже с алтаитом PbTe и паоловитом Pd_2Sn . Иногда встречаются оторочки или сростания котульскита с теларгпалитом (рис. 7д). Как правило, его размер менее 5-10 мкм. Подобно мончеиту, в верхах Зоны Конникова котульскит содержит много свинца – до 15-20 мас.%, содержание ртути меняется от долей % до 6.5 мас.%. При этом широко варьируют соотношения Te и Bi , поскольку в отдельных зернах содержание Bi достигает ~ 17 мас.%. Обнаружен также близкий к стехиометричному фрудит PdBi_2 (до 7 мкм), который ассоциирует с мончеитом и котульскитом, иногда образуя сростания с алтаитом.

Главным носителем серебра в сульфидоносных троктолитах являются пентландит и кубанит (см. раздел по геохимии сульфидов); с этой “Iss-ассоциацией” связаны проявления теларгпалита $(Pd, Ag)_3Te$, который наиболее характерен для верхов Зоны Конникова. Иногда он встречается в виде редких обособлений в силикатной матрице, но чаще в виде неправильной формы выделений по периферии или на контактах мончеита и котульскита с Pn-Cub агрегатами (рис. 7 гд). При этом преобладают зерна с отсутствием или следами свинца, но в отдельных случаях содержание Pb в теларгпалите достигает 4 мас.% (Спиридонов и др., 2019а). Содержание ртути варьирует от ~1 до 11 мас.% Hg. Изображение 7д интересно тем, что на границе крупного зерна мончеита с силикатной матрицей установлена тонкая оторочка неидентифицированной фазы сложного состава, включающей (по массе) ~33% Pd, 22 % Ag, 29% Te, 5% Pt, 6% Pb и 7% Hg. Отношение $(Pd+Ag+Pt)/(Te+Pb+Hg)$ в этой фазе около 2, т.е. промежуточное между теларгпалитом и котульскитом.

Для пегматоидных троктолитов крупные выделения МПГ на краях сульфидных зерен нетипичны. Большинство платинометаллических фаз установлены внутри сульфидов: висмотеллуриды и висмутиды Pt и Pd чаще на границах кубанита и пирротина (Рис. 8а) или внутри кубанита (рис. 8б); в двух случаях мелкие зерна мончеита наблюдались в пирротине и продуктах его вторичных изменений. В отличие от верхов Зоны Конникова, содержание ртути в мончеите обычно ниже предела обнаружения (табл. 3). В единственном случае установлено включение инсизваита $PtBi_2$ в пирротине (Рис. 8в). Фрудит $PdBi_2$ диагностирован дважды в виде композитных зерен: в первом случае – при срастании с соболевскитом в серпентин-хлоритовой матрице вторичных изменений (рис. 8г); во втором – как часть гетерогенного овального выделения на границе пирротина и кубанита, возможно ликвационной природы (см. Обсуждение результатов). Заслуживает внимания, что для главных носителей теллура - мончеита (8 зерен) и масловита (4 зерна) – характерны высокие отношения Bi/Te , что значительно отличает эти МПГ от аналогов из верхней части Зоны Конникова (табл. 3) и подчеркивает своего рода “висмуттовую специализацию” ЭПГ-минерализации. Другой характерной особенностью пегматоидных сульфидов является распространение мелких (обычно <1-2 мкм) зерен паоловита Pd_2Sn , чаще в кубаните, но также в пирротине.

Из других связанных с сульфидами фаз отметим алтаит $PbTe$, иногда в виде сростаний с висмутотеллуридами платины и палладия (рис. 3б). Нередки мелкие (<5 мкм) зерна сфалерита в кубанитовой матрице и на границах кубанита и пирротина. Субидиорфная форма наиболее крупного кристалла сфалерита размером 15 мкм позволяет

предполагать низкотемпературную историю постсолидусных преобразований исходных сульфидных растворов (см. Обсуждение результатов). Из неидентифицированных фаз в пирротине и продуктах его вторичных изменений обнаружено два включения сульфоарсенидов размером <5 мкм, содержащих около 22 мас.% As, 16-18.8% S и ~55% платиноидов (Ru+Ir+Os+Rh+Pt). В прожилках вторичных изменений сульфидов встречаются выделения аргентита Ag_2S и гессита Ag_2Te , иногда в ассоциации с самородным серебром. В одном случае установлено присутствие амальгамы золота (Au-Hg).

ГЕОХИМИЯ ПОРОД И СУЛЬФИДНЫХ ФАЗ

Валовые содержания петрогенных оксидов и несовместимых микроэлементов в троктолитах приведены в табл. 4. Геохимическая специфика сульфидоносных разновидностей не отличается от обычных троктолитов, которые подробно рассмотрены в обзоре (Ariskin et al., 2018b). Для этих пород характерны крайне низкие содержания несовместимых элементов, нередко ниже чем в дунитах, и отчетливые максимумы содержаний Sr и Eu. Данный факт подчеркивает относительное накопление полевошпатового компонента, которое, вероятно, обусловлено отгонкой интеркумуляусного расплава из протокумулята на фоне его котектической (O1+P1) докристаллизации. В контексте статьи, мы акцентируем внимание на поведении халькогенов и ряда халькофильных элементов, концентрации которых, включая ЭПГ, приведены в табл. 5. Эти данные показывают, что максимальным содержаниям серы отвечают повышенные концентрации Se и Te. Это позволяет рассматривать халькогены как индикатор степени накопления сульфидов, что удобно при построении графиков, указывающих на связь концентрации ЭПГ и общего количества сульфидных фаз (Ariskin et al., 2018c). Подобные соотношения показаны на рис. 9, который демонстрирует положительные корреляции концентрации Pd, Pt, Au и Cu в зависимости от валового содержания теллура.

Сублинейный характер этих соотношений выражается в том, что составы разнообразных типов пород и руд Довырена ложатся на единый тренд, связывающий составы модельных протосульфидных жидкостей (красная звездочка на рис. 9) и закаленных пород из основания массива. Это позволяет предполагать отнюдь не прямые генетические связи (что было бы странно для пород, удаленных по разрезу почти на 1.5 км), а общий геохимический источник – довыренскую магму, и однотипные законы дифференциации при зарождении, миграции и эволюции несмесимых сульфидов. При

этом интересен тот факт, что, подобно данным для сульфидоносных ультрамафитов Довырена (Ariskin et al., 2018c), отчетливая корреляция концентраций Au и Te не оставляет другой интерпретации как указание на сульфидный прекурсор, в котором в качестве изначальных компонентов присутствовали не только платиноиды и медь, но также золото. Эти же данные демонстрируют очевидный парадокс, поскольку состав закаленного пикродолерита, по определению включающего примитивный сульфидный материал (зеленая звездочка на рис. 9), оказывается близок составу троктолитов с сульфидной минерализацией высокомедистого типа, т.е. сульфидов, представляющих наиболее поздние и низкотемпературные стадии эволюции Iss-растворов (рис. 5). Физико-химическая трактовка этого противоречия дается при обсуждении результатов.

Значение S/Se и Se/Te отношений в породах. Интервал мантийных значений отношения S/Se (2850-4350), традиционно используется для определения минерализованных пород и сульфидных фаз, сохранивших метку первичного мантийного происхождения (Queffurs, Barnes, 2015; Holwell, Keays, 2015). Принято считать, что повышенные отношения S/Se > 4350 могут указывать на контаминацию коровых пород, а относительно низкие значения S/Se < 2850 являются результатом потери серы в постмагматических процессах (Smith et al., 2016). Данные для сульфидоносных троктолитов демонстрируют пограничные значения, которые указывают скорее на мантийный источник с низким вкладом контаминированного компонента и незначительную роль вторичных процессов (табл. 5). При этом надо учитывать альтернативный механизм повышения S/Se в сульфидах и минерализованных породах, связанный с возможностью существенной экстракции селена сульфидной жидкостью из силикатной магмы ($D_i^{Sf/Melt}$ для селена составляет порядка 1500, см. Smith et al. (2016)) по мере прогрессирующей силикатно-сульфидной несмесимости.

Широкие вариации S/Te отношений (табл. 5) можно рассматривать как еще одно свидетельство эволюции протосульфидного вещества. Принимая содержание 19.3 ppm Te и 35.5 мас.% S в исходном сульфиде (Ariskin et al., 2018c), получаем отношение 18394. Наиболее близки этой оценке характеристики образцов 13DV551-4a и -4e (колонки 8 и 9 в табл. 5). Они относятся к породам из нижней части зоны Конникова, содержащим максимальное количество продуктов распада моносульфидного раствора – от 60 до 77% пирротина (\pm троилит) и пентландита (табл. 2). Остальные троктолиты с богатой сульфидами меди минерализацией демонстрируют низкие значения S/Te в интервале от 600 до 4318. Таким образом, относительно предполагаемого исходного сульфида троктолиты разбиваются на две группы: (1) породы с повышенными в 1.4-2.1 раза и (2)

резко пониженными отношениями S/Te. Подобные соотношения отвечают законам кристаллизации сульфидных растворов, когда реститовые Mss-ассоциации обеднены легкими платиноидами и Te при комплементарном накоплении этих элементов на фронте кристаллизации в остаточной более медистой сульфидной жидкости (Holwell, McDonald, 2007; Helmy et al., 2007; Дистлер и др., 2016; Синякова и др., 2017, 2019).

Геохимия сульфидных фаз. В поисках дополнительных аргументов, указывающих на геохимическую эволюцию и возможное пространственное разделение фракций протосульфидных жидкостей, мы определили микроэлементный состав главных сульфидных минералов из троктолитов. Методом LA-ICP-MS было изучено 6 образцов: D8/15, D12/15, 13DV551-4, 13DV554-1-3 и -1-12, а также дополнительные препараты для обр. 07DV403-1. Всего получено 148 анализов (Po – 30, Pn – 43, Cru – 20, Cub – 55) для основных металлов (Fe, Ni, Cu, Co) и 17 микроэлементов (Os, Ir, Ru, Rh, Pt, Pd, Au, Ag, Re, Zn, Cd, Mo, Pb, Bi, Sb, Se, Te).

Сложность подобных исследований обусловлена фазовой неоднородностью сульфидных зерен, поскольку при последовательном испарении сульфидного вещества и диаметре лазерного пучка 22-40 μm далеко не всегда опробованы монокристаллы. Тем не менее, контролируя соотношения основных металлов (Fe/Ni для пентландита, Cu/Fe для халькопирита и кубанита) удается оценить степень однородности и получить надежные оценки концентраций в каждой сульфидной фазе, подробнее см. в (Ariskin et al., 2016). С другой стороны, объектом исследования являются продукты распада Mss- и Iss-растворов, которые (в зависимости от субсолидусных преобразований) могут демонстрировать широкий диапазон составов по главным компонентам для одной и той же минеральной фазы. Это проявляется в вариациях Fe/Ni при изучении пентландита – в среднем 1.50 ± 0.30 . Аналогично, под условно “кубанитом” мы понимаем сульфиды, обычно содержащие < 0.5 мас.% Ni, с параметрами, близкими CuFe_2S_3 (по массе Cu/Fe~0.5) и нестехиометричной, часто микрогетерогенной фазой с повышенными до ~0.7 Cu/Fe-отношениями. В случае халькопирита обычно фиксируются фазы устойчивого состава с Cu/Fe~1. Для продуктов распада Mss (смесь пирротина и троилита) в составе испаряемого материала резко преобладает железо (около 63.5 мас.%), при этом суммарное содержание Ni+Cu не превышает одного 1 мас.%. На рис. 10 представлены все данные о концентрации халькогенов, платиноидов, Ag и Au в сульфидных фазах из изученных троктолитов; для сравнения показаны составы примитивных сульфидов из пикродолерита зоны закалки (Ariskin et al., 2018c).

Эти результаты подтверждают наблюдения, что в сульфидах расслоенных массивов максимальные концентрации Os, Ir, Ru, Rh, Pd и Te характерны для пентландита (Barnes et al., 2008). В случае Ag и Se видим соизмеримые содержания этих элементов в пентландите и кубаните, тогда как концентрации Pt и Au во всех сульфидных зернах редко превышают 0.01 ppm (рис. 10), чаще – за пределами чувствительности метода. Такая же картина характерна для распределения платины и золота в сульфидах из ультрамафитов базальной зоны и закаленных пород Йоко-Довыренского массива (Ariskin et al., 2016, 2018c), см. зеленые звездочки на рис. 10. С учетом сульфидного контроля этих элементов в троктолитах (рис. 9), мы связываем подобные соотношения с обособлениями основной массы платины в виде мончеита (рис. 7, 8), а Au – субмикронных выделений высокопробного электрума.

При сопоставлении данных для кубанита и пентландита устанавливается еще одна закономерность. В первом случае наблюдается перекрытие концентраций благородных металлов и халькогенов в продуктах кристаллизации Iss и Mss (голубые крестики на рис. 10). Для пентландита отмечаем бимодальность распределения Te и Pd: минимальные содержания этих элементов характерны для пегматоидных (производных от Mss) сульфидов, причем подобные вариации достигают 2-3 порядков. Этот факт согласуется с выводом, основанном на анализе S/Te отношений в троктолитах, что Mss-ассоциации пегматоидных сульфидов в целом обеднены Pd и Te по сравнению с продуктами распада Iss-сульфидных растворов. Более наглядно это проявлено при сопоставлении средних составов пентландита в каждом из образцов в табл. 6 и на рис. 11, где вариации содержаний показаны в зависимости от концентрации родия.

Выбор родия в качестве показателя эволюции состава пентландита (как главного концентратора благородных металлов в продуктах эволюции Mss- и Iss-растворов) объясняется отсутствием собственных фаз в сульфидоносных троктолитах и последовательным обогащением более медистых фракций сульфидов (рис. 11). Такое поведение согласуется с результатами экспериментов (Mungall, 2005), которые предсказали резкое снижение коэффициента распределения Rh между Mss и остаточным сульфидом в условиях ниже QFM в модельных системах. Экспериментальными измерениями собственной летучести кислорода в оливине из довыренских кумулатов указывают на интервал ниже QFM, примерно до QFM-2.5 (Арискин и др., 2017б).

Данные рис. 11 показывают, что в случае Se, Pd, Ru и Ir наблюдается отчетливая положительная ковариация с родиём, причем минимальные содержания характерны для

пегматоидных Fe-Ni сульфидов (обр. 13DV551-4a), а максимальные – для богатых сульфидами меди вкраплений из верхней части зоны Конникова (обр. 13DV554-1-3 и -12). При этом состав пентландита Mss-ассоциации из основания зоны Конникова в среднем близок пентландиту, представляющему примитивные сульфиды из зоны закалки (DV30-1 в табл. 6). В случае теллура такая ковариация нарушается, очевидно в связи с образованием мончеита $Pt(Te, Bi)_2$, крупные выделения которого отмечаются по периферии и внутри сульфидных зерен (рис. 7, 8). Вероятно, по той же причине отсутствуют признаки накопления серебра в пентландите, поскольку в верхах Зоны Конникова теларгпалит $(Pd, Ag)_3Te$ (наравне с котульскитом) обычно сопутствует обособлениям мончеита.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Проблема образования локальной (в отдельных участках) или латеральной (рифы) ЭПГ-минерализации в расслоенных интрузивах сводится к ответу на два главных вопроса: (1) фазовая природа концентратора благородных металлов, способного к перемещению и отложению платиноидов, золота и серебра в количествах, в тысячи раз превышающих содержание в исходных магмах, и (2) физический механизм переноса и концентрирования этого носителя ЭПГ в породах-кумулятах. В теории рудообразования обсуждаются две концепции, причем в обоих важную роль играет присутствие сульфидов. Это связано с минералогией пород, вмещающих ЭПГ-рифы, обычной особенностью которых является малосульфидная минерализация (Maier, 2005).

Первая гипотеза предполагает экстракцию платиноидов из магмы сульфидными расплавами, которые возникают в результате силикатно-сульфидной несмесимости (Campbell, Naldrett, 1979; Naldrett, 2004) и под действием гравитации могут перемещаться вниз, собираясь в слои частично закристаллизованных кумулатов, см. обзоры (Godel, 2015; O'Driscoll, González-Jiménez, 2016). Альтернатива оформилась в 90-х годах прошлого столетия под влиянием работ (Boudreau, McCallum 1992ab), где авторы допустили возможность растворения ЭПГ-содержащих сульфидов поздним хлор- и водосодержащим флюидом и его миграцию вверх, с последующим переотложением обогащенного сульфидного вещества на фронте флюидного насыщения. В качестве главных аргументов обычно приводится способность ЭПГ образовывать устойчивые хлоридные комплексы, присутствие хлорапатита и обнаружение Cl-содержащих включений в минералах из некоторых рудоносных комплексов.

Проблема в том, что повышенные содержания хлора в образцах как правило приурочены к верхним частям и контактам расслоенных интрузивов, где коррелируют с максимальным количеством интеркумулусного расплава и накоплением других несовместимых компонентов (Cawthorn, 1994; Барков, Никифоров, 2015). Ультраобедненность троктолитов Довырена редкими землями, Y, Zr, Hf, Ti, P, U, Th, Ba и Rb (Ariskin et al., 2018b) указывает на крайне низкую пористость кумулатов и вероятное обеднение хлором. Это объясняет, почему в этих адкумулатах (включая сульфидоносные) нам не удалось найти ни одного зерна хлорапатита. По этой причине, идея переноса сульфидов и ЭПГ Cl-содержащими флюидами сквозь массу троктолитов представляется маловероятной. Напротив, установлено, что эти породы консервировали в составе только следы сильно восстановленных легких газов H_2 , CH_4 и CO (Konnikov et al., 2000; Орсов, 2019), тогда как в сульфидоносных разновидностях наблюдается накопление относительно тяжелых летучих компонентов, включая Se, Te, Mo и другие элементы, проявляющие халькофильные свойства (Sn, Pb, Cd, Ag, Au и платиноиды, табл. 5).

Учитывая шпирообразную форму обособлений с рассеянными сульфидами (рис. 2) и пойкилитовую структуру пегматоидных прожилков (рис. 3), а также незначительное присутствие вторичных гидросиликатов (см. ппп в табл. 4), приходим к выводу, что минерализация троктолитов дает пример аккумуляции сульфидов “в чистом виде”, когда отсутствует необходимость привлечения крупномасштабного флюидного переноса. Это не означает, что реакции с участием флюидов не играли никакой роли при последующей эволюции сульфидоносных кумулатов. Мы полагаем, что растворенные в сульфидном веществе компоненты (включая некоторое количество воды) оказали локальное влияние на разнообразие продуктов низкотемпературных преобразований продуктов субсолидусного распада, особенно по периферии протосульфидных агрегаций в процессе их кристаллизации *in situ*. Подобная трактовка явления позволяет абстрагироваться от наложенных и дополнительных факторов и, применительно к сульфидоносным троктолитам, сосредоточиться на параметрах формирования и эволюции исходных сульфидных жидкостей в толще затвердевающих троктолитовых кумулатов.

Интерпретация линий сульфидного контроля. Тот факт, что максимальные концентрации халькогенов в троктолитах отвечают максимуму валового содержания серы (табл. 5), а концентрации Pd, Pt, Au и Cu коррелируют с теллуrom (рис. 9), свидетельствует, что распределение благородных металлов контролируется количеством сульфидов. Следствием этого являются положительные ковариации платиноидов и меди, которые традиционно рассматривают в виде характеристических зависимостей, в

частности отношения Cu/Pd от Pd (Naldrett, 2004). Сублинейный характер этих трендов находит простое объяснение, как результат монотонной эволюции состава сульфидов в процессах силикатно-сульфидной несмесимости по закону, вытекающему из рассмотрения бинарной системы силикатный расплав – сульфидная жидкость (Campbell, Naldrett, 1979):

$$Y_i^{Sf} = X_i^{Magma} D_i^{Sf/Melt} \frac{R+1}{R+D_i^{Sf/Melt}}, \quad (1)$$

где Y_i^{Sf} и X_i^{Magma} – содержания i -элемента в сульфиде и исходной магме, $D_i^{Sf/Melt}$ – равновесный коэффициент распределения сульфид-расплав, а R – так называемый R -фактор, равный отношению массы расплава (магмы) f_{Melt} к количеству выделившейся сульфидной фазы f_{Sf} , т.е. $R = f_{Melt} / f_{Sf}$. В этом случае, любая точка на кривых природной зависимости Cu/Pd от Pd интерпретируется как продукт последовательного обеднения сульфидов Pd и Cu, но с разной скоростью, поскольку коэффициенты распределения Pd между сульфидом и расплавом на 1.5-2 порядка превышают таковые для меди (Mungall, Brenan, 2014). Графические реконструкции с использованием R -фактора приводятся в сотнях публикаций и на протяжении нескольких десятилетий являются основой интерпретации геохимических трендов минерализованных пород и сортности сульфидных руд.

Арискин и др. (2017а) обратили внимание, что этот подход не применим к системам, изначально недосыщенным относительно сульфида, а в случае проявления силикатно-сульфидной несмесимости в интеркумулусе должно учитываться количество кристаллов и пропорция выделения сульфида относительно других минеральных фаз. В общем случае, уравнение эволюции состава сульфида в многофазовой системе имеет вид:

$$Y_i^{Sf} = X_i^{Magma} D_i^{Sf/Melt} \frac{(R+1)}{(R+D_i^{Sf/Melt})(1-f_{Crys})}, \quad (2)$$

где параметр f_{Crys} – суммарная доля силикатных фаз и оксидов, кристаллизующихся в гетерогенной смеси породообразующих минералов, несмесимых сульфидов и остаточного расплава. Корректное решение этой задачи предполагает использование алгоритмов, позволяющих моделировать разные стадии сульфидной ликвации на фоне последовательной кристаллизации исходных магм и примитивных кумулатов (Ariskin et al., 2018a).

Природа бимодальности сульфидного вещества. В случае сульфидоносных троктолитов Довырена, идея последовательной эволюции состава несмесимых сульфидных жидкостей сталкивается с явным противоречием. Состав пикродолерита с примитивными сульфидами (Ariskin et al., 2018c) по всем пяти элементам на рис. 9 практически совпадает с породами, включающими рассеянную минерализацию с преобладанием сульфидов меди. И, наоборот, крайне обедненные МПГ пегматоидные разности (с преобладанием продуктов Mss (рис. 8)) оказываются близки троктолитам из верхней части Зоны Конникова, несущими более медистую сульфидную и разнообразную ЭПГ-минерализацию (рис. 7). Это связано с разным количеством сульфидного материала в изученных образцах. На рис. 12 показаны те же данные, пересчитанные на 100% сульфидной массы по схеме (Ariskin et al., 2018c).

Эти соотношения показывают, что усредненный сульфидный материал троктолитов по составу разделяется на две контрастные группы – резко обедненные платиноидами, Au, Cu и Te, и в 10-50 раз обогащенные. Причем первые несколько беднее халькофильными элементами по сравнению с прогнозным составом наиболее примитивного сульфида (красная звездочка на рис. 12), а вторые заметно богаче. Это позволяет предполагать ограниченные масштабы фракционирования несмесимых сульфидов по мере кристаллизации троктолитовых кумулатов и искать причины столь контрастных различий в постликвационной и, вероятно, сусубсолидусной эволюции исходных сульфидных систем. На это указывают особенности минералогии сульфидных фаз, которые позволяют отнести группу наиболее обедненных ЭПГ сульфидов к продуктам кристаллизации Mss, а группу обогащенных платиноидами и золотом сульфидов – к относительно поздним дериватам Iss-типа (рис. 5, 6). Этот вывод подкрепляется данными LA-ICP-MS исследований микроэлементного состава сульфидных фаз (рис. 10, 11).

Таким образом, совокупность минералогических особенностей и геохимических сигналов соответствует известным законам эволюции многокомпонентных сульфидных расплавов, при последовательной кристаллизации которых образуются моносульфидный и серия более низкотемпературных растворов, продуцирующих более медистые и богатые ЭПГ остаточные системы (Holwell, McDonald, 2007; Helmy et al., 2007; Дистлер и др., 2016; Синякова и др., 2017, 2019; Sinyakova et al., 2019). Интересно, что близкие к мантийным отношения S/Se и аномально высокие S/Te в богатых продуктами Mss пегматоидных троктолитах (колонка 8 в табл. 5) согласуются с экспериментально установленными вариациями Se/Te отношения при кристаллизации Mss-растворов (Helmy et al., 2010; Brenan, 2015).

Эволюция сульфидных растворов и образование минералов ЭПГ. Предложенная схема постликвационной эволюции протосульфидного вещества имеет очевидные следствия в отношении платинометалльных и других фаз, которые выделялись на разных стадиях кристаллизации и субсолидусного преобразования Mss- и Iss-растворов. При этом ортомагматическая история сульфидов задает геохимический фон, который предопределяет не только условия формирования и последующие изменения фазового состава Cu-Ni-Fe-сульфидных ассоциаций, но также разнообразие ЭПГ-минерализации. Мы выделяем четыре главные стадии:

(1) зарождение и агломерация первых несмесимых сульфидных глобул в межзерновом пространстве кристаллизующихся кумулатов при температурах несколько выше 1200°C – см. расчеты при помощи программы КОМАГМАТ-5 (Ariskin et al., 2018c). На этом этапе происходит первичная экстракция благородных металлов и халькогенов из интеркумулусных расплавов;

(2) миграция протосульфидных обособлений вниз по мере затвердевания оливин-плагиоклазовых кумулатов, вероятно по механизму выдавливания межзернового порового расплава под действием силы тяжести (Chung, Mungall, 2009). Эта стадия не предполагает существенного обмена благородными металлами между сульфидной фазой и силикатным веществом, если нижележащие кумулусные слои уже прошли стадию силикатно-сульфидной несмесимости;

(3) задержка крупных обособлений на фронте критически низкой пористости в нижней части троктолитовой зоны и начало кристаллизации моносульфидного раствора при близких к солидусным температурах, вероятно ниже $\sim 1100^{\circ}\text{C}$ (Kullerud et al., 1969). Соответственно – фракционирование состава остаточных сульфидов по линии накопления Cu, платиноидов, Au, Ag и халькогенов;

(4) пространственное разделение Mss-рестита и комплементарных сульфидных жидкостей, вероятно в условиях максимально широкого поля стабильности коннодной ассоциации Mss+Iss+сульфидный расплав при $\sim 900-820^{\circ}\text{C}$ (Craig, Kullerud, 1968; Tsujimura, Kitakaze, 2004), т.е. при температурах на $150-200^{\circ}\text{C}$ ниже сухого солидуса насыщенного оливином и плагиоклазом габброноритового расплава (Арискин и др., 2017a). Этот процесс мог происходить посредством просачивания высокомедистых и богатых ЭПГ-фракций на самых поздних этапах затвердевания кумулуса – по контракционным трещинам и микропоровым каналам с образованием гетерогенных шпиров и гнезд сульфидного материала в троктолитовой матрице (рис. 2).

Дальнейшая история первичных сульфидных ассоциаций включает субсолидусные реакции и серию полифазовых распадов *Mss*- и *Iss*-растворов. Верхний предел этих преобразований отвечает температурам около 800°C, которые согласуются с минимальными температурами равновесной кристаллизации расплавов в синтетических Cu-Ni-Fe сульфидных системах (Craig, Kullerud, 1968; Tsujimura, Kitakaze, 2004). При фракционной кристаллизации сульфидных расплавов возможно образование более низкотемпературных дериватов, вплоть до борнит-*tss* эвтектики при температуре около 580°C, где *tss* – матрица состава $\sim\text{Fe}_{21}\text{Ni}_{24}\text{Cu}_{10}\text{S}_{45}$ (Синева и др., 2018). Судя по присутствию виоларита (FeNi_2S_4) и пирита, запись субсолидусных преобразований в пегматоидных сульфидах прослеживается до температур 450-250°C (Craig, 1971, 1973). В случае богатой сульфидами меди рассеянной минерализации типоморфной фазой является талнахит $\text{Cu}_9\text{Fe}_8\text{S}_{16}$, который (в системе Cu-Fe-S) представляет продукт распада *Iss* при 520°C (Cabri, 1973), а при температурах ниже 230°C превращается в другие полиморфы (Raghavan, 2004). Таким образом, возможный диапазон температур формирования благородно-метальной минерализации, связанной с сульфидами, естественно разделить два этапа, сопряженных (1) с образованием и кристаллизацией несмесимых сульфидных жидкостей ($\sim 1100\text{-}800^\circ\text{C}$, возможно несколько ниже) и (2) постсолидусными преобразованиями сульфидных фаз (*Mss*, *Iss* и продукты их распада) по мере остывания вмещающих кумулатов при температурах примерно от 800°C до 250°C.

Альтернативной точки зрения придерживается Э.М. Спиридонов, который полагает, что большая часть минералов благородных металлов (Pd, Pt, Au, Ag) в виде халькогенов (\pm Sn, As, Sb, Ge) и постмагматических интерметаллидов представляют пневматолитово-метасоматические образования на контактах сульфидных зерен и внутри силикатной матрицы – при участии флюидов, порожденных Fe-Cu-Ni-сульфидными расплавами (Спиридонов и др., 2019аб). Эту позицию разделяют не все соавторы отмеченных публикаций, поскольку применительно к довыренским троктолитам “метасоматическая” гипотеза встречает ряд трудностей. Во-первых, вызывает вопрос возможность метасоматических реакций, которые могли бы привести к образованию субмикронных включений и относительно крупных зерен МПГ непосредственно внутри сульфидов (рис. 7а и 8абв). Во-вторых, сложно отнести к “силикатной матрице” практически бинарную смесь кумулюсного оливина и плагиоклаза, слагающих 97-99% объема троктолитов (табл. 1). При этом приходится допускать фантомную природу флюидов, не оставивших значимых следов в минералогии этих адкумулатов. Кроме того, вызывает сомнение, что метасоматические процессы могут объяснить устойчивость геохимических характеристик выделенных типов сульфидного материала, которые отвечают законам кристаллизации

Cu-Ni-Fe-PGE-Au-Te-S систем (рис. 11-12). Наконец, за рамками метасоматической парадигмы остается высокотемпературный интервал первого этапа (1100-800°C), для которого существуют многочисленные экспериментальные данные о выделении висмутотеллуридов и арсенидов Pt и Pd из сульфидных расплавов (Helmy et al., 2007, 2010; Синякова и др., 2017, 2019; Sinyakova et al., 2019).

Особый интерес представляют экспериментальные доказательства ликвации – расщепления ЭПГ-Vi-Te-содержащих сульфидных расплавов при 920-825°C с образованием глобул существенно теллуридных жидкостей, обогащенных Vi и платиноидами (Helmy et al., 2007). Эти данные явились основанием для вывода о существовании области несмесимости остаточных сульфидных систем при достижении критических значений Te/S в области температур несколько выше солидуса и частичной экстракции платиноидов в расплавы висмутотеллуридов. На рис. 13 показано овальное гетерофазовое образование (возможно срез каплевидного выделения), которое было обнаружено в препарате пегматоидного троктолита 13DV551-4а на границе пирротина и кубанита. Яркая фаза – фрудит (Pd, Pt, Ir, Au)Bi₂, светлосерая – Ru-Pt-Se-Pb-содержащий теллур, где содержание Te чуть выше 85 мас.%, а суммарное содержание свинца, селена и ЭПГ около 3 мас.% (остальные элементы – Fe, Cu, Cd, O). Низкая сумма для этого анализа (92.5%) и присутствие кислорода не позволяет говорить о надежной характеристике этой фазы, но мы отмечаем столь необычную находку, поскольку ее можно интерпретировать как свидетельство ликвации ЭПГ+Vi-содержащих теллуридных расплавов из сульфидной жидкости при кристаллизации $M_{ss} \pm I_{ss}$ растворов с последующим фазовым распадом (Helmy et al., 2007, 2010).

Анализ возможности и экспериментальная аргументация в пользу образования МПГ в области субсолидуса сульфидных систем выходит за рамки данной статьи. Отметим только, что длительная история остывания довыренских кумулатов (Ariskin et al., 2018b) предполагает своего рода отжиг минеральных ассоциаций и собирательную перекристаллизацию первичных зерен сульфидных и ЭПГ-фаз с образованием более совершенных индивидов, возможно с участием летучих компонентов из сульфидных растворов. Весьма вероятно, что низкотемпературная стадия второго этапа сопровождалась также гидротермально-метасоматическими преобразованиями новообразованных фаз под действием позднемагматических флюидов или наложенных (вторичных) процессов. Подобный сценарий почти не оставляет шансов для реконструкции состава и условий формирования исходного сульфидного вещества, если опираться только на диагностику наблюдаемых минеральных фаз и результаты LA-ICP-

MS исследований состава сульфидов. Эта генетическая запись присутствует в геохимии пород, пересчитанных на 100% сульфидной массы (Ariskin et al., 2018c).

ВЫВОДЫ

Проведенные исследования показывают, что фазой-носителем благородных металлов, халькогенов (Se, Te) и других халькофильных элементов (Sn, Pb, Mo, Cd) в троктолитах являлись протосульфидные расплавы и их производные. Геохимические особенности этих систем отвечают продуктам кристаллизации сульфидного прекурсора, близкого по составу несмешиваемой сульфидной жидкости, установленной при изучении базальных ультрамафитов Довырена (Ariskin et al., 2018c). Таким образом, вопрос о природе подвижного агента, транспортирующего платиноиды, золото и серебро в толще троктолитовых кумулатов, с физико-химической точки зрения представляется решенным. При этом проблема концентрирования благородных металлов трансформируется в плоскость конкретных физических механизмов и характеристик гетерогенной среды (реология, проницаемость, смачиваемость сульфидом разных фаз и т.д.), в которой возможны: (а) пространственное отделение Iss-жидкостей от Mss-рестита, (б) их инфильтрация вниз и (в) механическая аккумуляция на фазовых границах критически низкой проницаемости. Заметим, что идея обособления и аккумуляции низкотемпературных фракций Iss-подобных расплавов в интрузивных телах не нова (Mungall, 2007), но представленный нами материал впервые демонстрирует комплексное решение проблемы.

На данном этапе трудно сказать, в какой мере эти наблюдения и результаты применимы к анортозитам Главного Рифа с богатой ЭПГ-минерализацией. По ряду признаков геохимические характеристики этих пород, особенности минералогии сульфидов и МПГ близки сульфидоносным троктолитам (Ariskin et al., 2018b; Орсов, 2019; Спиридонов и др., 2019аб). Вместе с тем установлены тонкие отличия в химизме благороднометалльных фаз (Спиридонов и др., 2019а), что надо учитывать при развитии модели дифференциации и перколяции сульфидов как фактора концентрирования благородных металлов в довыренской камере.

И последнее – касательно гипотезы флюидного переноса богатого ЭПГ-материала. Среди сторонников этих идей распространено мнение, что в качестве транспортирующего агента флюидный поток способен к “сбросу” рудных компонентов и дальнейшей миграции наверх, фактически не оставив геохимических следов в зоне минерализации. Подобные механизмы нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Но если принять такую точку

зрения, в случае довыренских троктолитов придется признать, что было, как минимум, два типа таких потоков, которые несли S, Se, Te, Au, Ag, Cu и платиноиды в соотношениях, отвечающих законам кристаллизации Mss- и Iss- сульфидных растворов, при этом не смешиваясь между собой и не взаимодействуя с проточными кумулатами.

Работа поддержана грантом Российского Научного Фонда № 16-17-10129. Аналитические исследования в Лаборатории локальных методов исследования вещества кафедры петрологии геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова проводились с использованием микроанализатора JEOL JXA-8230, приобретенного за счет средств Программы развития Московского университета (аналитики Н.Н. Коротаева и В.О. Япаскурт). Авторы благодарны Д. Хатчинсону (David Hatchinson, CODES, Hobart, Australia) и Э.М. Спиридонову (МГУ им. М.В Ломоносова) за помощь в диагностике МПГ и фазового разнообразия сульфидов. Мы также высоко ценим помощь Карстена Гоемана (Karsten Goemann) и Сары Жильберт (Sarah Gilbert) из Тасманийского университета (г. Хобарт, Австралия) при съемках высокого разрешения и обработке результатов LA-ICP-MS исследований сульфидов. Выражаем признательность научным рецензентам работы – А.В. Соболеву, Н.Д. Толстых и А.Э. Изоху за содержательные комментарии, которые позволили улучшить окончательную версию рукописи. Статья проходит под номером 1384 в Ведущем ARC центре изучения флюидных систем от ядра до коры, Перт, Австралия (<http://www.ccfs.mq.edu.au>).

Для переводчика: эта последняя фраза должна звучать след. образом - "This is contribution 1384 from the ARC Centre of Excellence for Core to Crust Fluid Systems (<http://www.ccfs.mq.edu.au>)."

ЛИТЕРАТУРА

Арискин А.А., Конников Э.Г., Данюшевский Л.В., Костицын Ю.А., Меффре С., Николаев Г.С., Мак-Нил Э., Кислов Е.В., Орсоев Д.А. Геохронология Довыренского интрузивного комплекса в Неопротерозое (Северное Прибайкалье, Россия) // Геохимия, 2013, № 11, с. 955-972.

Арискин А.А., Данюшевский Л.В., Э.Г. Конников, Маас Р., Костицын Ю.А., Э. Мак-Нил Э., Меффре С., Николаев Г.С., Кислов Е.В. Довыренский интрузивный комплекс (Северное Прибайкалье, Россия): изотопно-геохимические маркеры контаминации исходных магм и экстремальной обогащенности источника // Геология и геофизика, 2015а, т. 56, № 3, с. 528-556.

Арискин А.А., Николаев Г.С., Данюшевский Л.В., Кислов Е.В., Малышев А.В., Бармина Г.С. Новый тип малосульфидной ЭПГ-минерализации в примитивных троктолитах Йоко-Довыренского расслоенного массива // Материалы XII Всероссийского Петрографического совещания (Петрозаводск-2015), 2015б, с. 289-291.

Арискин А.А., Бычков К.А., Николаев Г.С. Моделирование микроэлементного состава сульфидной жидкости в кристаллизующейся базальтовой магме: развитие концепции R-фактора // Геохимия, 2017а, № 5, с. 453-462.

Арискин А.А., Фомин И.С., Жаркова Е.В., Кадик А.А., Николаев Г.С. Окислительно-восстановительный режим формирования ультрамафитов и габброидов Йоко-Довыренского массива (по результатам измерений собственной летучести кислорода в оливине). Геохимия, 2017б, т. 55, № 7б с. 579-593.

Барков А.Ю., Никифоров А.А. Новый критерий поиска зон платинометальной минерализации типа “Кивакка Риф” // Вестник ВГУ. Серия: Геология, 2015, № 4, с. 75-83.

Гурулев С.А. Геология и условия формирования Йоко-Довыренского габбро-перидотитового массива. М.: Наука, 1965. 122 с.

Дистлер В.В., Степин А.Г. Малосульфидный платиноносный горизонт Йоко-Довыренского расслоенного гипербазит-базитового интрузива (Северное Прибайкалье) // Доклады РАН, 1993, т. 328, № 4, с. 498-501.

Дистлер В.В., Снякова Е.Ф., Косяков В.И. Поведение благородных металлов при фракционной кристаллизации богатых медью сульфидных расплавов // Доклады АН (Геохимия), 2016, т. 469, № 4, с. 461–464.

Кислов Е.В. Йоко-Довыренский расслоенный массив. Улан-Удэ, Изд. БНЦ СО РАН, 1998, 265 с.

Конников Э.Г. Дифференцированные гипербазит-базитовые комплексы докембрия Забайкалья. Новосибирск, Наука, 1986, 127 с.

Мануйлова М.М., Зарубин В.В. Вулканогенные породы докембрия Северного Прибайкалья. Л.: Наука, 1981. 88 с.

Орсоев Д.А., Кислов Е.В., Конников Э.Г., Канакин С.В., Куликова А.Б. Закономерности размещения и особенности состава платиноносных горизонтов Йоко-Довыренского расслоенного массива (Северное Прибайкалье) // Доклады РАН, 1995, т. 340, № 2, с. 225-228.

Орсоев Д.А., Мехоношин А.С., Э.Г. Канакин С.В., Бадмацыренова Р.А., Хромова Е.А. Габбро-перидотитовые силлы верхнерифейского Довыренского интрузивного комплекса (Северное Прибайкалье, Россия) // Геология и геофизика, 2018, т. 59, № 5, с. 589-605.

Орсоев Д.А. Анортозиты малосульфидного платиноносного горизонта (Риф I) в верхнерифейском Йоко-Довыренском массиве (Северное Прибайкалье): новые данные по составу, ЭПГ-Cu-Ni минерализации, флюидному режиму и условиям образования // Геология рудных месторождений, 2019, т. 61, № 4, с. 15-43.

Рыцк Е.Ю., Шалаев В.С., Ризванова Н.Г., Крымский Р.Ш., Макеев А.Ф., Риле Г.В. Олокитская зона Байкальской складчатой области: новые изотопно-геохронологические и петрохимические данные // Геотектоника, 2002, № 1, с. 29-41.

Синёва С.И. В. И. Косяков В.И., Синякова Е.Ф., Новожилова О.С. Кристаллизация квазибинарной эвтектики bnss-tss в системе Cu-Fe-Ni-S // Конденсированные среды и межфазные границы, 2019, т. 20, № 4, с. 650-658.

Синякова Е.Ф., Косяков В.И., Борисенко А.С. Влияние примесей As, Bi, Te на поведение платиновых металлов при фракционной кристаллизации сульфидной магмы // Докл. АН (Геохимия), 2017, т. 477, № 4, с. 470-474.

Синякова Е.Ф., Косяков В.И., Борисенко А.С., Карманов Н.С. Поведение примесей благородных металлов при фракционной кристаллизации Cu-Fe-Ni-(Pt, Pd, Rh, Ir, Ru, Ag, Au, Te) сульфидных расплавов // Геология и геофизика, 2019, т. 60, № 6, с. 820-842.

Спиридонов Э.М. Рудно-магматические системы Норильского рудного поля // Геология и геофизика, 2010, т. 51, с. 1356-1378.

Спиридонов Э.М., Орсоев Д.А., Арискин А.А., Николаев Г.С., Е.В. Кислов Е.В., Коротаева Н.Н., Япаскурт В.О. Hg- и Cd-содержащие минералы Pd, Pt, Au, Ag сульфидоносных базитов и гипербазитов Йоко-Довыренского интрузива в байкалидах Северного Прибайкалья // Геохимия, 2019а, т. 64, № 1, с. 43-58.

Спиридонов Э.М., Орсоев Д.А., Арискин А.А., Е.В. Кислов Е.В., Коротаева Н.Н., Николаев Г.С., Япаскурт В.О. Германий-содержащие минералы палладия –

палладогерманид Pd₂Ge, Ge-паоловит Pd₂(Sn,Ge), звягинцевит сульфидоносных анортозитов Йоко-Довыренского интрузива, Прибайкалье // Геохимия, 2019б, т. 64, № 5, с. 554-558.

Толстых Н.Д., Орсов Д.А., Кривенко А.П., Изох А.Э. благороднометаллическая минерализация в расслоенных ультрабазит-базитовых массивах юга Сибирской платформы. Новосибирск, Параллель, 2008, 193 с.

Ariskin A.A., Kislov E.V., Danyushevsky L.V., Nikolaev G.S., Fiorentini M.L., Gilbert S., Goemann K., Malyshev A. Cu-Ni-PGE fertility of the Yoko-Dovyren layered massif (Northern Transbaikalia, Russia): thermodynamic modeling of sulfide compositions in low mineralized dunite based on quantitative sulfide mineralogy // Mineralium Deposita, 2016, v. 51, p. 993-1011.

Ariskin A.A., Bychkov K.A., Nikolaev G.S., Barmina G.S. (2018a) The COMAGMAT-5: Modeling the effect of Fe-Ni sulfide immiscibility in crystallizing magmas and cumulates // Journal of Petrology, 2018a, v. 59, p. 283-298.

Ariskin A., Danyushevsky L., Nikolaev G., Kislov E., Fiorentini M., McNeill A., Kostitsyn Yu., Goemann K., Feig S., Malyshev A. The Dovyren Intrusive Complex (Southern Siberia, Russia): Insights into dynamics of an open magma chamber with implications for parental magma origin, composition, and Cu-Ni-PGE fertility // Lithos, 2018b, v. 302-303, p. 242-262.

Ariskin A.A., Nikolaev G.S., Danyushevsky L.V., Fiorentini M., Kislov E.V., Pshenitsyn I.V. Genetic interpretation of the distribution of PGE and chalcogens in sulfide-mineralized rocks from the Yoko-Dovyren layered intrusion // Geochemistry International, 2018c, v. 56, p. 1322-1340.

Barnes S.-J., Prichard H.M., Cox R.A., Fisher P.C., Godel B. The location of the chalcophile and siderophile elements in platinum-group element ore deposits (a textural, microbeam and whole rock geochemical study): Implications for the formation of the deposits // Chemical Geology, 2008, v. 248, p. 295-317.

Boudreau A.E., McCallum I.S. Infiltration metasomatism in layered intrusions-an example from the Stillwater Complex, Montana // Journal of Volcanology and Geothermal Research, 1992a, v. 52, p. 171-183.

Boudreau A.E., McCallum I.S. Concentration of platinum-group elements by magmatic fluids in layered intrusions // Economic Geology, 1992b, v. 87, p. 1830-1848.

Brenan J.M. Se-Te fractionation by sulfide-silicate melt partitioning: Implications for the composition of mantle-derived magmas and their melting residues // Earth and Planetary Science Letters, 2015, v. 422, p. 45-57.

Cabri L.J. New data on phase relations in the Cu-Fe-S system // *Economic Geology*, 1973, v. 68, p. 443-454.

Campbell I.H., Naldrett A.J. The influence of silicate:sulfide ratios on the geochemistry of magmatic sulfides // *Economic Geology*, 1979, v. 74, p. 1503-1506.

Cawthorn R.G. Formation of chlor- and fluor-apatite in layered intrusions // *Mineralogical Magazine*, 1994, v. 58, p. 299-306.

Chung H.-Y., Mungall J.E. Physical constraints on the migration of immiscible fluids through partially molten silicates, with special reference to magmatic sulfide ores // *Earth and Planetary Science Letters*, 2009, v. 286, p. 14-22.

Craig J.R. Violarite stability relations // *American Mineralogist*, 1971, v. 56, p. 1303-1311.

Craig J.R. Pyrite-pentlandite assemblages and other low-temperature relations in the Fe-Ni-S systems // *American Journal of Science*, 1973, v. 273A, p. 496-510.

Craig J.R., Kullerud G. The Cu-Fe-Ni-S System // *Carnegie Inst. Washington, Yearbook* 1968, v. 66, p. 413-417.

Ernst R.E., Hamilton M.A., Söderlund U., Hanes J.A., Gladkochub D.P., Okrugin A.V., Kolotilina T., Mekhonoshin A.S., Bleeker W., LeCheminant A.N., Buchan K.L., Chamberlain K.R., Didenko A.N. Long-lived connection between southern Siberia and northern Laurentia in the Proterozoic // *Nature Geoscience*, 2016, v. 9, p. 464-469.

Godel B., Barnes S.-J., Maier W.D. Platinum-Group Elements in Sulphide Minerals, Platinum-Group Minerals, and Whole-Rocks of the Merensky Reef (Bushveld Complex, South Africa): Implications for the Formation of the Reef // *Journal of Petrology*, 2007, v. 48, p. 1569-1604.

Godel B. Platinum-group element deposits in layered intrusions: recent advances in the understanding of the ore forming processes // In: Charlier B., Namur O., Latypov R., Tegner C. (eds) *Layered Intrusions*. Springer, Dordrecht, 2015, pp. 379-432.

Helmy H.M., Ballhaus C., Berndt J., Bockrath C., Wohlgemuth-Ueberwasser C. Formation of Pt, Pd and Ni tellurides: experiments in sulfide-telluride systems // *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 2007, v. 153, p. 577-591.

Helmy H.M., Ballhaus C., Wohlgemuth-Ueberwasser C., Fonseca R.O.C., Laurenz V. Partitioning of Se, As, Sb, and Bi between monosulfide solid solution and sulfide melt - application to magmatic sulfide deposits // *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 2010, v. 74, p. 6174-6179.

Holness M.B., Vukmanovic Z., Mariani E. Assessing the Role of Compaction in the formation of adcumulates: a microstructural perspective // *Journal of Petrology*, 2017, v. 58, p. 643-673.

Holwell D. A. and McDonald I. Partitioning of platinum group elements in the Platreef at Overysel, northern Bushveld Complex: a combined PGM and LA ICP–MS study // *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 2007, v. 154, p. 171-190.

Holwell D.A., Keays R.R., McDonald I., Williams M.R. Extreme enrichment of Se, Te, PGE and Au in Cu sulfide microdroplets: evidence from LA-ICP-MS analysis of sulfides in the Skaergaard Intrusion, east Greenland // *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 2015, v. 170, 53, DOI 10.1007/s00410-015-1203-y.

Konnikov E.G., Meurer W.P., Neruchev S.S., Prasolov E.M., Kislov E.V., Orsoev D.A. Fluid regime of platinum group elements (PGE) and gold-bearing reef formation in the Dovyren mafic-ultramafic layered complex, eastern Siberia, Russia // *Mineralium Deposita*, 2000, v. 35, p. 526-532.

Kullerud G., Yund R.A., Moh G.H. Phase relations in the Cu-Fe-S, Cu-Ni-S and Fe-Ni-S systems // *Economic Geology Monograph*, 1969, v. 4, p. 323-343.

Maier W.D. Platinum-group element (PGE) deposits and occurrences: mineralization styles, genetic concepts, and exploration criteria // *Journal of African Earth Sciences*, 2005, v. 41, p. 165-191.

Mungall J.E. Magmatic geochemistry of the platinum-group elements // In: Mungall J.E. (ed) *Exploration for platinum-group elements deposits. Short Course Ser. (Mineral Assoc Canada)*, 2005, v. 35, p. 1-34.

Mungall J.E. Crystallization of magmatic sulfides: An empirical model and application to Sudbury ores // *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 2007, v. 71, p. 2809-2819.

Mungall J.E., Brenan J.M. Partitioning of platinum-group elements and Au between sulfide liquid and basalt and the origins of mantle-crust fractionation of the chalcophile elements // *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 2014, 125, p. 265-289.

Naldrett A.J. (Magmatic sulfide deposits: geology, geochemistry and exploration. Heidelberg, Berlin: Springer-Verlag, 2004, 727 pp.

Oberthür T. Platinum-group element mineralization of the Main Sulfide Zone, Great Dyke, Zimbabwe // *Reviews in Economic Geology*, 2011, v. 17, p. 329-349.

O'Driscoll B., González-Jiménez J.M. Petrogenesis of the Platinum-Group Minerals // *Reviews in Mineralogy and Geochemistry*, 2016, v. 81 p. 489-578.

Queffurus M., Barnes S.-J. Processes affecting the sulfur to selenium ratio in magmatic nickel–copper and platinum-group element deposits // *Ore Geology Reviews*, 2015, v. 69, p.

301-324.

Sinyakova E., Kosyakov V., Palyanova G., Karmanov N. Experimental modeling of noble and chalcophile elements fractionation during solidification of Cu-Fe-Ni-S melt // *Minerals*, 2019, v. 9, DOI: 10.3390/min9090531.

Raghavan V. Cu-Fe-S (Copper-Iron-Sulfur) // *Journal of Phase Equilibria and Diffusion*, 2004, v. 25, No. 5, p. 450-454.

Smith J.W., Holwell D.A., McDonald I., Boyce A.J. The application of S isotopes and S/Se ratios in determining ore-forming processes of magmatic Ni–Cu–PGE sulfide deposits: A cautionary case study from the northern Bushveld Complex. *Ore Geology Reviews*, 2016, v. 73, p. 148-174.

Tsujimura T., Kitakaze A. New phase relations in the Cu–Fe–S system at 800°C; constraint of fractional crystallization of a sulfide liquid // *N. Jb. Miner. Mh.*, 2004, v. 10, p. 433–444.

Таблица 1. Стратиграфическое положение и особенности состава сульфидоносных и неминерализованных троктолитов.

№ п/п	Образец	h, м*	Порода	CIPW, мас.%		Составы, мол.%		S, мас.%	Cu, ppm
				OI	PI	Fo (OI)	An (PI)		
1	07DV313-2	1208	Троктолит	56	43	85.8±0.3	87.4±0.7	<0.01	8.9
2	D12/15	1231	Сульфидоносный лейкотроктолит	37	60	83.3±0.3	87.1±0.4	0.19	1084
3	07DV314-2	1251	Троктолит	74	24	82.0±0.2	86.9±2.8	0.01	20.3
4	07DV314-4	1281	Троктолит	77	22	84.2±0.1	87.0±0.5	0.02	30.0
5	07DV403-1	1288	Троктолит**	55	44	84.6±0.2	87.2±2.1	0.01	72.5
6	D9/15	1291	Троктолит**	75	24	83.2±0.1	86,4±0.5	0.003	34.0
7	D8/15	1294	Троктолит**	67	31	82.1±0.3	85.2±0.9	0.006	33.0
8	13DV551-4a	1298	Пегматоидный троктолит	50	41	82.5±0.2	84.7±0.7	2.82	3335
9	13DV551-4e	1298.3	Сульфидоносный троктолит	60	38	82.6±0.4	85.6±1.2	0.76	1240
10	07DV403-2	1300	Троктолит	53	47	84.3±0.1	85.7±0.3	0.01	641
11	D10/15 и D11/15	1388	Троктолит**	74	25	83.1±0.1	86.1±1.2	0.003	5.1
12	13DV554-1	1660	Сульфидоносный троктолит	57	42	84.0±0.4	87.9±1.8	0.09	486
13	13DV554-4	1670	Сульфидоносный троктолит	70	29	84.5±0.3	87.3±1.1	0.02	372

Примечания. Все образцы отобраны в тальвеге и параллельно бортам руч. Центральный, вкрест простирания массива на расстоянии по склону около 460 м (рис. 1). Полужирным шрифтом выделены образцы с бедной и убогой минерализацией из Зоны Конникова. * Стратиграфическая реконструкция расстояния от нижнего контакта Йоко-Довыренского массива - соответственно сводному разрезу вдоль руч. Большой с уточнениями, см. Ariskin et al. (2018b). При этом стратиграфический уровень контакта между дунитами и троктолитами принят равным 1190 м. ** Установлена убогая сульфидная минерализация (см. изображение шлифа для обр. 07DV403-1 на рис. 2). Пропорции оливина и

плаггиоклаза рассчитаны по валовым составам пород в приближении 5 отн.% окисленного железа. Средние составы этих минералов рассчитаны по анализам от 5 до 20 зерен. Отсутствие значимых содержаний серы и меди в некоторых из образцов с убогой минерализацией объясняется неравномерным распределением сульфидов и предварительной отборкой редких фрагментов с сульфидной вкрапленностью для проведения LA-ICP-MS исследований. В этом случае в препарат для XRF-анализа попадало незначительное количество сульфидного материала.

Таблица 2. Пропорции сульфидных фаз в минерализованных троктолитах (по результатам MLA)

Образец	Тип вкраплений	Метод	Минеральные фазы, %*			
			Po±Tr	Pn	Cpy	Cub**
<i>Сульфиды в пикродолерите из зоны закалки</i>						
DV30-1	Редкие гнезда	<i>XMOD_STD</i>	78.6	12.0	8.7	0.7
<i>Сульфиды в породах нижней части зоны Конникова</i>						
07DV403-1	Шлиры с рассеянной вкрапленностью	<i>XMOD_STD</i>	5.0	15.1	10.1	69.8
07DV403-1а***		<i>XMOD_STD</i>	15.4	9.6	8.7	66.4
13DV551-2-2****	Шлиры с рассеянной вкрапленностью	<i>XMOD_STD</i>	20.7	23.3	4.5	51.6
		<i>SPL_Lt</i>	22.5	37.7	9.6	30.2
13DV551-4b-4	Пегматоидные	<i>SPL_Lt</i>	49.8	26.7	4.0	19.5
<i>Сульфиды в породах верхней части зоны Конникова</i>						
13DV554-1-3	Шлиры с рассеянной вкрапленностью	<i>XMOD_STD</i>	10.9	14.0	20.5	54.7
		<i>SPL_Lt</i>	9.6	16.7	15.5	58.2
13DV554-1-12	Шлиры с рассеянной вкрапленностью	<i>XMOD_STD</i>	10.9	12.2	3.0	73.9
		<i>SPL_Lt</i>	8.5	19.8	9.3	62.5

Примечания. Для сравнения приведен состав примитивных сульфидов из зоны закалки Йоко-Довыренского массива (Ariskin et al., 2018c). Различия методов *XMOD_STD* и *SPL_Lt* см. в тексте. * Пропорции сульфидных фаз оценены как отношения площади опробованных микроплощадок к общей площади сульфидов в образце. ** Обозначение “Cub” относится к стехиометричной фазе соответствующего состава и, в ряде случаев, к высокомедистой фазе с переменными отношениями Cu и Fe. *** В случае образца 07DV403-1 приведены данные для двух шашек. **** Образец 13DV551-2-2 отобран из развалов вблизи образца с пегматоидной вкрапленностью – 13DV551-4 (табл. 1).

Таблица 3. Составы минералов ЭПГ из сульфидоносных троктолитов Зоны Конникова

Подзоны	Нижняя, пегматоидный троктолит 13DV551-4а и обр. 13DV551-1-6*								Верхняя, обр. 13DV554-1 и 13DV554-4				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
№ п/п													
Pt	20,39	22,07	4,26	32,94	0,47	-	36,18	-	34,50	39,00	37,76	37,76	33,53
Pd	8,86	7,95	1,33	0,36	20,96	32,31	0,2	62,76	2,64	-	-	1,16	1,91
Rh	-	-	0,34	-	-	-	-	-	0,47	0,46	0,16	1,17	0,65
Ru	-	-	1,05	-	-	-	-	0,41	0,71	0,35	1,00	0,37	0,71
Ir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,51	-	-	-
Os	-	-	0,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ag	0,25	0,27	-	-	0,29	-	0,21	-	-	-	-	-	-
Cu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	0,63
Ni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	0,26	0,13	0,15
Fe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Te	18,97	17,33	33,19	4,5	-	5,63	24,04	1,03	42,06	48,50	39,59	59,67	41,34
Bi	47,09	47,09	8,65	58,62	78,2	58,5	38,75	-	1,92	5,88	1,02	6,16	1,07
Pb	-	-	45,69	-	-	-	-	-	10,33	3,06	10,04	-	10,43
Sn	-	-	-	-	-	-	-	36,6	-	-	-	-	-
Sb	-	-	-	2,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As	-	-	-	-	0,66	-	-	-	-	-	-	-	-
Hg	-	-	-	-	-	-	-	-	6,98	0,93	9,80	-	8,95
Сумма, мас.%	95,56	94,71	95,02	98,57	100,58	96,44	99,38	99,8	99,61	99,87	99,63	99,69	99,37
<i>Число атомов в формуле</i>													
Pt	0,56	0,61	0,08	1,00	0,01	-	0,99	-	0,83	0,93	0,93	0,87	0,81
Pd	0,44	0,41	0,04	0,02	1,01	0,97	0,01	1,96	0,12	-	-	0,06	0,09
Rh	-	-	0,01	-	-	-	-	-	0,02	0,02	0,01	0,05	0,03
Ru	-	-	0,04	-	-	-	-	0,01	0,03	0,02	0,05	0,02	0,03
Ir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-
Os	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ag	0,01	0,01	-	-	0,01	-	0,01	-	-	-	-	-	-
Cu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0,05
Ni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01
Fe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Te	0,79	0,74	0,91	0,21	-	0,14	1,00	0,03	1,56	1,76	1,50	1,85	1,52
Bi	1,20	1,23	0,14	1,66	1,92	0,89	0,99	-	0,04	0,13	0,02	0,13	0,02
Pb	-	-	0,77	-	-	-	-	-	0,24	0,02	0,23	-	0,23
Sn	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
Sb	-	-	-	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Hg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16	0,02	0,24	-	0,21
Сумма, ф.е.	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3

Примечания. * Из отвалов в точке отбора пегматоидных троктолитов в низах троктолитовой зоны. Рисунки а, б и г – для образца 13DV551-4а, в - 13DV551-1-6. Номера 1-6 отвечают номерам фаз на Рис. 8: 1 - мончеит (Pt,Pd,Ag)_{1,01}(Te,Bi)_{1,99}, 2 и 3 – сросток мончеита (Pt,Pd,Ag)_{1,03}(Te,Bi)_{1,97} и ЭПГ-содержащего “алтаита” (Pb,ЭПГ)_{0,95}(Te,Bi)_{1,05}, 4 –

инсизваит $(\text{Pt}, \text{Pd})_{1,02}(\text{Bi}, \text{Te}, \text{Sb})_{1,98}$, 5 и 6 – сросток фрудита $(\text{Pd}, \text{Pt}, \text{Ag})_{1,03}(\text{Bi}, \text{Te})_{1,97}$ и соболевскит $\text{Pd}_{0,97}(\text{Bi}, \text{Te})_{1,03}$, 7 – масловит $(\text{Pt}, \text{Pd}, \text{Ag})_{1,01}\text{Bi}_{0,99}\text{Te}$, 8 – паоловит $(\text{Pd}, \text{Ru})_{1,97}(\text{Sn}, \text{Te})_{1,03}$. Номера 9-13 отвечают составам из табл. 1-3 в работе (Спиридонов и др., 2019а), где данные для троктолитов из верхней части Зоны Конникова с рассеянной сульфидной вкрапленностью были неточно представлены как “пегматоидные”: 9 – 3(T) в табл. 1, 10 и 11 – 5(T) и 6(T) в табл. 2, 12 и 13 – 7(T) и 8(T) в табл. 3.

Таблица 4. Содержания петрогенных оксидов и несовместимых микроэлементов в изученных образцах

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SiO ₂	42,50	43,75	41,21	40,71	42,50	41,03	41,66	38,97	40,55	42,72	41,24	42,05	41,07
TiO ₂	0,02	0,04	0,04	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,04
Al ₂ O ₃	14,82	21,28	8,14	7,66	15,47	8,27	10,81	13,83	13,27	16,03	8,75	14,76	10,34
FeO	8,35	5,97	11,65	11,87	8,30	11,38	10,40	13,20	12,10	8,26	11,23	9,64	11,60
MnO	0,13	0,09	0,17	0,17	0,12	0,16	0,15	0,12	0,13	0,12	0,16	0,13	0,16
MgO	25,49	15,94	33,29	34,56	24,49	33,87	30,28	22,23	25,22	23,53	33,08	24,66	30,50
CaO	7,80	11,09	4,60	4,11	8,10	4,44	5,72	7,21	6,75	8,32	4,64	7,70	5,38
Na ₂ O	0,58	1,24	0,36	0,30	0,64	0,31	0,52	0,73	0,61	0,69	0,37	0,59	0,39
K ₂ O	0,05	0,09	0,03	0,02	0,03	0,03	0,04	0,07	0,05	0,03	0,04	0,04	0,04
P ₂ O ₅	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Cr ₂ O ₃	0,15	0,20	0,34	0,40	0,19	0,38	0,27	0,20	0,25	0,19	0,31	0,17	0,29
NiO	0,10	0,10	0,14	0,15	0,10	0,11	0,13	0,59	0,26	0,08	0,14	0,13	0,16
S		0,19	0,01	0,02	0,01		0,01	2,82	0,76			0,09	0,02
Сумма	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ппп	0,11	1,48	-0,35	-0,06	0,44	-0,06	1,51	1,55	1,19	-0,16	0,37	0,20	<0,05

Содержания микроэлементов, ppm

Li	1,82	1,70	2,60	2,43		2,40	2,80	2,70	2,60		2,60	1,90	2,60
Cs	0,009	0,022	0,017	0,050		0,045	<0,013	<0,013	<0,013		<0,013	<0,013	<0,013
Rb	0,61	1,21	0,80	0,45	0,10	0,38	0,41	0,74	0,34	0,20	0,30	0,25	0,55
Sr	107,3	144,7	60,8	59,8	108,8	61,1	80,0	102,7	93,8	130,6	65,8	90,7	72,6
Ba	22,5	43,0	15,4	12,5	24,5	13,0	18,5	35,7	26,0	20,2	15,2	22,5	16,2
Y	0,42	0,89	0,93	0,24	<1	0,22	0,30	0,48	0,34	<1	0,26	0,36	0,45
Zr	1,32	4,00	2,97	0,67	1,10	1,50	1,50	1,50	<6	1,10	1,50	7,00	7,00
Hf	0,034	<0,14	0,083	0,018		<0,14	<0,14	<0,14	<0,14		<0,14	0,150	0,160
Nb	0,074	0,186	0,134	0,043	<0,5	0,048	0,059	0,091	0,089	<0,5	0,043	0,065	0,117
Ta	0,010	0,013	0,013	0,008		<0,007	<0,007	<0,007	<0,007		<0,007	<0,007	<0,007
La	0,619	1,290	0,667	0,260		0,310	0,510	1,150	0,770		0,360	0,640	0,670
Ce	1,082	2,480	1,291	0,456		0,510	0,820	1,880	1,420		0,700	1,160	1,290
Pr	0,117	0,259	0,155	0,052		0,064	0,106	0,233	0,161		0,073	0,134	0,140
Nd	0,438	1,020	0,625	0,197		0,220	0,350	0,780	0,610		0,260	0,510	0,570
Sm	0,083	0,186	0,141	0,036		0,031	0,063	0,129	0,108		0,045	0,093	0,098
Eu	0,106	0,160	0,078	0,049		0,058	0,077	0,127	0,107		0,063	0,098	0,081
Gd	0,075	12,510	0,145	0,032		4,930	6,450	8,430	0,079		5,430	0,069	0,088
Tb	0,012	0,026	0,025	0,006		0,007	0,009	0,017	0,011		0,006	0,011	0,015
Dy	0,073	0,150	0,163	0,040		0,032	0,049	0,096	0,071		0,038	0,066	0,087
Ho	0,016	0,031	0,034	0,010		0,008	0,012	0,019	0,014		0,009	0,015	0,019
Er	0,046	0,098	0,105	0,029		0,033	0,038	0,068	0,045		0,035	0,045	0,067
Tm	0,008	0,014	0,017	0,006		0,005	0,006	0,009	0,008		0,006	0,008	0,009
Yb	0,058	0,085	0,116	0,045		0,035	0,051	0,064	0,048		0,048	0,048	0,068
Lu	0,010	0,015	0,020	0,008		0,008	0,011	0,012	0,008		0,011	0,009	0,011
Pb	0,33	2,40	0,32	1,10		0,80	0,40	14,40	5,50		0,40	0,80	0,70
Th	0,067	0,182	0,133	0,030		0,046	0,050	0,052	0,060		0,046	0,083	0,074
U	0,010	0,034	0,020	0,006		<0,011	0,013	0,013	0,017		<0,011	0,011	0,023

Примечания. Номера образцов отвечают последовательности в табл. 1. Содержания главных и примесных элементов в неминерализованных троктолитах (1, 3, 4) определены в аналитической лаборатории Тасманийского университета (CODES, г. Хобарт, Австралия) – XRF+ICP-MS. Остальные (сульфидоносные) троктолиты изучены в лаб. GEOLABS (г. Онтарио, Канада), см. пояснения к аналитическим методам.

Таблица 5. Концентрации халькогенов и халькофильных элементов в изученных образцах

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
S, мас.%		0,19	0,01	0,02	0,01	0,003	0,006	2,82	0,76	0,003		0,09	0,02
Содержания микроэлементов, <i>ppm</i>													
Se	<0.4	0,70	<0.4	<0.4		<0.4	<0.4	5,90	1,50		<0.4	<0.4	<0.4
Te	<0.05	0,49	<0.05	<0.05		0,05	0,04	0,69	0,29		0,03	0,21	0,16
Zn	47	76	58	59	48	71	70	163	63	48	72	54	69
Cu	9	1084	20	30	73	34	33	3335	1240	9	5	486	372
Co	754	814	1138	1143	805	863	1022	4668	2000	641	1105	1011	1229
Ni	101	80	133	150	100	159	136	267	153	99	147	105	133
Mo	0,019	0,090	0,015	0,015		0,080	0,060	0,120	0,260		0,070	0,330	0,170
Ag		0,31				0,03	0,02	1,74	0,73		0,01	0,15	0,11
Cd	0,008	0,065	0,011	0,020		0,024	0,027	0,453	0,301		0,031	0,036	0,037
Sn	0,032	0,330	0,043	0,272		0,210	0,340	0,820	0,410		0,210	<0.16	0,200
Pb	0,33	2,40	0,32	1,10		0,80	0,40	14,40	5,50		0,40	0,80	0,70
Благородные металлы, <i>ppb</i>													
Au		40,0				<0.4	1,2	63,1	7,5		0,4	31,3	23,4
Ir		7,3				3,3	5,6	8,5	6,3		5,9	8,6	7,8
Pd		138,0				4,5	13,7	252,0	89,1		13,3	232,0	136,0
Pt		188,0				6,0	11,8	189,0	63,7		26,4	182,0	117,0
Rh		12,5				2,3	2,2	8,5	5,8		1,7	10,5	8,3
Ru		12,9				9,8	9,7	10,2	8,0		8,5	7,9	11,5
S/Te		3857				600	1500	40884	26335		1000	4318	1254
S/Se		2700						4781	5091				

Примечания. Номера образцов отвечают последовательности в табл. 1 и 4.

Таблица 6. Составы пентландита в пикродолерите и изученных образцах сульфидоносных троктолитов из Зоны Конникова

Образец	DV30-1 [7]	D12/15 [6]	07DV403-1 [7]	D8/15 [2]	13DV551-4a [6]	13DV554- 1-3 [12]	13DV554- 1-12 [10]
Главные металлы, мас.%							
Fe	35,22 (2,17)	37,23 (0,64)	39,38 (0,75)	36,14 (1,29)	34,82 (1,12)	39,92 (1,59)	39,70 (2,81)
Ni	27,35 (2,38)	24,71 (1,16)	24,57 (2,00)	24,96 (0,14)	27,94 (1,29)	22,60 (1,97)	22,21 (2,99)
Cu	0,07 (0,13)	1,24 (0,96)	0,42 (0,29)	1,92 (1,43)	0,10 (0,17)	0,42 (0,85)	1,11 (1,75)
Co	1,39 (0,27)	0,84 (0,07)	1,01 (0,35)	1,02 (0,24)	1,18 (0,13)	1,02 (0,15)	0,96 (0,24)
S*	35,96	35,97	34,62	35,96	35,96	36,04	36,02
Халькогены, умеренно- и высокохалькофильные элементы, ppm							
Se	95,6 (26,5)	530 (171)	423 (86)	232 (54)	111 (53)	849 (277)	654 (272)
Te	30,0 (34,7)	66 (37)	31 (29)	46 (12)	17 (21)	43 (45)	27 (20)
Zn	2,4 (3,7)	21 (16)	1,8 (2,2)	289 (248)**	4,7 (3,1)	3,6 (2,9)	5,5 (4,7)
Mo	0,02 (0,02)	0,21 (0,13)	9,1 (13,3)	0,12	0,8 (0,5)	1,1 (1,7)	5,8 (13,7)
Ag	16,0 (10,2)	10,6 (4,8)	11,5 (3,7)	27,2	14,7 (6,3)	17,8 (24,1)	19,6 (16,8)
Cd	0,01 (0,01)	2,0 (1,2)	0,19 (0,09)	7,4 (4,9)	1,8 (0,6)	1,9 (1,0)	1,1 (0,9)
Sb	0,13 (0,12)	0,39	н.о.	н.о.	н.о.	н.о.	н.о.
Pb	5,1 (3,9)	14,9 (9,1)	3,8 (3,2)	80 (58)**	12,3 (5,7)	28,86	19,8 (19,2)
Os	0,36 (0,26)	2,0 (2,4)	2,8 (1,9)	1,4 (0,4)	н.о.	4,2 (3,3)	2,7 (1,8)
Ir	0,021 (0,022)	0,67 (0,79)	1,7 (0,8)	1,3 (0,8)	0,12 (0,05)	6,7 (4,0)	3,8 (3,8)
Ru	2,0 (2,0)	2,9 (3,2)	1,8 (1,6)	3,7(1,6)	0,38 (0,04)	7,6 (4,7)	3,6 (2,4)
Rh	0,67 (0,90)	2,2 (1,0)	8,0 (4,2)	3,4 (1,4)	1,0 (1,6)	23,1 (7,2)	11,1 (8,8)
Pd	11,3 (4,1)	5,2 (4,9)	64 (50)	10,1 (4,0)	0,29 (0,15)	34 (29)	19 (33)
Pt	0,054	0,06 (0,01)	0,08	0,09	н.о.	0,04 (0,02)	0,04 (0,03)
Au	н.о.	н.о.	0,04	н.о.	н.о.	0,04 (0,04)	0,05 (0,04)

Примечания. *По разности от 100%, ** вероятны включения сфалерита и галенита. Составы пентландита определены методом LA-ICP-MS в Тасманийском университете (см. текст); данные для пикродолерита DV30-1 см. табл. 4 в работе (Ariskin et al., 2018c). В квадратных скобках – число анализов, в круглых скобках указаны стандартные отклонения (1σ); их отсутствие означает единственность измерения; н.о. – не определено (ниже чувствительности).

ПОДПИСИ К РИСУНКАМ

Рис. 1. Средняя и северо-восточная часть горы Довырен с местоположением участка разреза с обнажениями сульфидоносных и ЭПГ-минерализованных троктолитов

Рис. 2. Строение Йоко-Довыренского массива (Ariskin et al., 2018b), распределение Cu, Ni, серы, Pt и Pd в нижней половине троктолитовой зоны

На врезке слева - микрофотография шлифа обр. 07DV403-1 (желтая фаза – халькопирит) и фотография коренного обнажения троктолитов со шлирами сульфидной вкрапленности примерно с того же стратиграфического уровня (справа). Зона Конникова имеет мощность около 400 м (см. пунктирные стрелки). Красными кружками отмечены детально изученные образцы с точек наблюдения 13DV551 (вблизи находки 07DV403-1) внизу и 13DV554 вверху.

Рис. 3. Исходный образец минерализованного троктолита 13DV551-4а (а), продукт его распиловки с прожилком и “нашлепкой” (б) и демонстрационный образец пегматоидного троктолита с обильными сульфидами (в), выпиленный из верхушки образца на рис. 3б

Стрелки на рис. 3в указывают на ксеноморфные выделения сульфидов (серое).

Рис. 4. Микроизображения сульфидоносных троктолитов в высоком разрешении, полученные путем сканирования шлифов с использованием поляризационных пленок

а – обр. 13DV551-4а с прожилками полевошпатового материала и контактом с пегматоидным троктолитом, б - обр. 13DV554-1, из которого нарезались аншлифы для изучения сульфидных фаз и минералов ЭПГ. В этом образце прослеживается ориентировка минеральных зерен, вероятно отражающая деформации при уплотнении и докристаллизации исходного кумулата (см. текст).

Рис. 5. Продукты твердофазовых превращений богатых медью сульфидных Ni-Cu-Fe твёрдых растворов: Iss1 → → Iss5 (в отраженных электронах, см. сноску 3)

а – кристалл Iss1, претерпевший распад на троилит, кубанит и обособленный пентландит (обр. D12/15a); б – часть кристалла Iss2, представленного продуктами распада твердого раствора на кубанитовую матрицу и ламели халькопирита и пентландита (D12/15a); в – мелкий кристалл Iss4, испытавший двухстадийный распад, в результате которого превращён в крупно- и мелкопластинчатые срастания кубанита с халькопиритом и обособленный пентландит (D11/15a-1); г – зерно алтаита (PbTe, белый), секущее границу пентландита и ламеллярных срастаний халькопирита и талнахита (более светлый) - как продукты распада Iss5 (обр. D12-15a).

Рис. 6. Микроизображения сульфидов из пегматоидного троктолита 13DV551-4 (аншлиф 13DV551-4a-2d), в отраженных электронах

а - участок крупного кристалла Mss, который испытал распад на пирротин, пентландит (серое) и кубанит (светло-серое); б – сульфидная интерстиция между кристаллами плагиоклаза и оливина, выполненная продуктами распада Mss.

Рис. 7. Микроизображения ЭПГ-фаз в сульфидоносном троктолите из верхней части зоны Конникова (препараты 13DV554-1-3 и -12), полученные при помощи автоэлектронного эмиссионного микроскопа Hitachi SU-70 FESEM ультравысокого разрешения.

а – цепочки композитных зерен, сложенных преимущественно мончеитом (светлосерое) и котульскитом (серое); б – росток мончеита и пентландита, как продуктов кристаллизации Iss-раствора; в – иголочка (сечение пластинки?) мончеита с включениями теларгпалита; г – композитное зерно мончеита и котульскита с включениями теларгпалита и фрагментом тетраферроплатины; д – крупное зерно мончеита с двумя оторочками: субмикронной из нестехиометричной (вероятно гетерогенной) Pd-Ag-Pt-Te-Pb-Hg фазы вдоль границы с силикатной матрицей и двухфазовой, сложенной прорастваниями котульскита и теларгпалита на контакте с Pn-Cub агрегатом. Индексация минералов ЭПГ: 1 – мончеит Pt(Te, Bi, Pb, Hg)₂, 2 – котульскит Pd(Te, Bi, Pb), 3 – теларгпалит (Pd, Ag)₃(Te, Hg), 4 – потарит PdHg, 5 – тетраферпроплатина Pt(Fe, Cu).

Рис. 8. Микроизображения ЭПГ-фаз в сульфидоносном троктолите из нижней части зоны Конникова (обр. 13DV551-4а и 13DV551-1-1), полученные при помощи электронного микроскопа JSM-6480LV.

а – зерно мончеита (1) на границе пирротина и кубанита, б – сросток мончеита (2) и алтаита (3) в кубаните; в – вкрапление инсизваита (4) внутри частично измененного зерна пирротина, г – композитное зерно высоко-Vi фаз в серпентинит-хлоритовой матрице из ореола вторичных изменений крупного сульфидного зерна, включая фрудит (5) и соболевсвит (6). Индексация минералов отвечает составам в табл. 3.

Рис. 9. Концентрации легких платиноидов, Au и Cu в зависимости от валового содержания теллура

Синий цвет относится к нижней части Зоны Конникова, розовый – к верхней: 1 – породы с рассеянными медистыми сульфидами, 2 – пегматоидные троктолиты; 3 – обр. 13DV554-1 13DV554-4 (№ 12 и 13 в табл. 4). Для сравнения показаны данные работы (Ariskin et al., 2018с): пикродолерит представляет примитивный материал из зоны закалки (обр. DV30-1), сидеронитовая руда – обр. 07DV107-1, а “исходный сульфид” – оценку состава первичной несмесимой сульфидной жидкости при помощи программы КОМАГМАТ-5, которая отвечает 88% кристаллизации примитивного ортокумулата DV30-2 при температуре 1125°C и содержании в системе 0.13 мас.% сульфида.

Рис. 10. Концентрации халькогенов, платиноидов, Ag и Au в сульфидных фазах из пикродолерита и изученных троктолитов

Данные LA-ICP-MS анализов для пикродолерита DV30-1 (Ariskin et al., 2018с), троктолитов с рассеянными (07DV403-1, D8/15, D12/15, 13DV554-1-3 и -12) и пегматоидными (13DV551-4) сульфидами.

Рис. 11. Концентрации халькогенов, платиноидов и серебра в зависимости от родия в пентландите из пикродолерита и изученных троктолитов

Обозначения те же, что на рис. 9. Данные LA-ICP-MS анализов из табл. 6. Размах цветных линий отвечает стандартным отклонениям (1σ).

Рис. 12. Нормированные концентрации легких платиноидов, Au и Cu в зависимости от нормированного содержания теллура

Обозначения те же, что на рис. 9. Нормировка проводилась путем пересчета валовых концентраций элементов на 100% сульфидной массы в породе, при этом исходный сульфид (красная звездочка) представляет оценку состава наиболее примитивной сульфидной жидкости, полученную по результатам моделирования при помощи программы КОМАГМАТ-5 (Ariskin et al., 2018ac).

Рис. 13. Гетерофазовое выделение фрудита и ЭПГ-содержащего теллура на границе пирротина и кубанита в пегматоидном сульфиде.




Рис. 1. Средняя и северо-восточная часть горы Довырен с местоположением участка разреза с обнажениями сульфидоносных и ЭПГ-минерализованных троктолитов

Арискин и др. “Петрология, геохимия и происхождение сульфидоносных и ЭПГ-минерализованных троктолитов из зоны Конникова в Йоко-Довыренском расслоенном интрузиве”




Рис. 2. Строение Йоко-Довыренского массива (Ariskin et al., 2018b), распределение Cu, Ni, серы, Pt и Pd в нижней половине троктолитовой зоны

На врезке слева - микрофотография шлифа обр. 07DV403-1 (желтая фаза – халькопирит) и фотография коренного обнажения троктолитов со шлирами сульфидной вкрапленности примерно с того же стратиграфического уровня (справа). Зона Конникова имеет мощность около 400 м (см. пунктирные стрелки). Красными кружками отмечены детально изученные образцы с точек наблюдения 13DV551 (вблизи находки 07DV403-1) внизу и 13DV554 сверху.

Арискин и др. “Петрология, геохимия и происхождение сульфидоносных и ЭПГ-минерализованных троктолитов из зоны Конникова в Йоко-Довыренском расслоенном интрузиве”




Рис. 3. Исходный образец минерализованного троктолита 13DV551-4а (а), продукт его распиловки с прожилком и “нашлепкой” (б) и демонстрационный образец пегматоидного троктолита с обильными сульфидами (в), выпиленный из верхушки образца на рис. 3б
Стрелки на рис. 3в указывают на ксеноморфные выделения сульфидов (серое).

Арискин и др. “Петрология, геохимия и происхождение сульфидоносных и ЭПГ-минерализованных троктолитов из зоны Конникова в Йоко-Довыренском расслоенном интрузиве”




Рис. 4. Микроизображения сульфидоносных троктолитов в высоком разрешении, полученные путем сканирования шлифов с использованием поляризационных пленок

а – обр. 13DV551-4а с прожилками полевошпатового материала и контактом с пегматоидным троктолитом, б - обр. 13DV554-1, из которого нарезались аншлифы для изучения сульфидных фаз и минералов ЭПГ. В этом образце прослеживается ориентировка минеральных зерен, вероятно отражающая деформации при уплотнении и докристаллизации исходного кумулата (см. текст).

Арискин и др. “Петрология, геохимия и происхождение сульфидоносных и ЭПГ-минерализованных троктолитов из зоны Конникова в Йоко-Довыренском расслоенном интрузиве”




Рис. 5. Продукты твердофазовых превращений богатых медью сульфидных Ni-Cu-Fe твёрдых растворов: Iss1 → → Iss5 (в отраженных электронах, см. сноску 3)

а – кристалл Iss1, претерпевший распад на троилит, кубанит и обособленный пентландит (обр. D12/15a); б – часть кристалла Iss2, представленного продуктами распада твердого раствора на кубанитовую матрицу и ламели халькопирита и пентландита (D12/15a); в – мелкий кристалл Iss4, испытавший двухстадийный распад, в результате которого превращён в крупно- и мелкопластинчатые срастания кубанита с халькопиритом и обособленный пентландит (D11/15a-1); г – зерно алтаита (PbTe, белый), секущее границу пентландита и ламеллярных срастаний халькопирита и талнахита (более светлый) - как продукты распада Iss5 (обр. D12-15a).

Арискин и др. “Петрология, геохимия и происхождение сульфидоносных и ЭПГ-минерализованных троктолитов из зоны Конникова в Йоко-Довыренском расслоенном интрузиве”




Рис. 6. Микроизображения сульфидов из пегматоидного троктолита 13DV551-4 (аншлиф 13DV551-4a-2d), в отраженных электронах

а - участок крупного кристалла Mss, который испытал распад на пирротин, пентландит (серое) и кубанит (светло-серое); б – сульфидная интерстиция между кристаллами плагиоклаза и оливина, выполненная продуктами распада Mss.

Арискин и др. “Петрология, геохимия и происхождение сульфидоносных и ЭПГ-минерализованных троктолитов из зоны Конникова в Йоко-Довыренском расслоенном интрузиве”




Рис. 7. Микроизображения ЭПГ-фаз в сульфидоносном троктолите из верхней части зоны Конникова (препараты 13DV554-1-3 и -12), полученные при помощи автоэлектронного эмиссионного микроскопа Hitachi SU-70 FESEM ультравысокого разрешения.

а – цепочки композитных зерен, сложенных преимущественно мончеитом (светлосерое) и котульскитом (серое); б – сrostок мончеита и пентландита, как продуктов кристаллизации Iss-раствора; в – иголочка (сечение пластинки?) мончеита с включениями теларгпалита; г – композитное зерно мончеита и котульскита с включениями теларгпалита и фрагментом тетраферроплатины; д – крупное зерно мончеита с двумя оторочками: субмикронной из нестехиометричной (вероятно гетерогенной) Pd-Ag-Pt-Te-Pb-Hg фазы вдоль границы с силикатной матрицей и двухфазовой, сложенной прорастаниями котульскита и теларгпалита на контакте с Pn-Cub агрегатом. Индексация минералов ЭПГ: 1 – мончеит $Pt(Te, Bi, Pb, Hg)_2$, 2 – котульскит $Pd(Te, Bi, Pb)$, 3 – теларгпалит $(Pd, Ag)_3(Te, Hg)$, 4 – потарит $PdHg$, 5 – тетраферпроплатина $Pt(Fe, Cu)$.

Арискин и др. “Петрология, геохимия и происхождение сульфидоносных и ЭПГ-минерализованных троктолитов из зоны Конникова в Йоко-Довыренском расслоенном интрузиве”




Рис. 8. Микроизображения ЭПГ-фаз в сульфидоносном троктолите из нижней части зоны Конникова (обр. 13DV551-4а и 13DV551-1-1), полученные при помощи электронного микроскопа JSM-6480LV.

а – зерно мончеита (1) на границе пирротина и кубанита, б – сросток мончеита (2) и алтаита (3) в кубаните; в – вкрапление инсизвайта (4) внутри частично измененного зерна пирротина, г – композитное зерно высоко-Vi фаз в серпентинит-хлоритовой матрице из ореола вторичных изменений крупного сульфидного зерна, включая фрудит (5) и соболевсвит (6). Индексация минералов отвечает составам в табл. 3.

Арискин и др. “Петрология, геохимия и происхождение сульфидоносных и ЭПГ-минерализованных троктолитов из зоны Конникова в Йоко-Довыренском расслоенном интрузиве”




Рис. 9. Концентрации легких платиноидов, Au и Cu в зависимости от валового содержания теллура

Синий цвет относится к нижней части Зоны Конникова, розовый – к верхней: 1 – породы с рассеянными медистыми сульфидами, 2 – пегматоидные троктолиты; 3 – обр. 13DV554-1 13DV554-4 (№ 12 и 13 в табл. 4). Для сравнения показаны данные работы (Ariskin et al., 2018c): пикродолерит представляет примитивный материал из зоны закалки (обр. DV30-1), сидеронитовая руда – обр. 07DV107-1, а “исходный сульфид” – оценку состава первичной несмешиваемой сульфидной жидкости при помощи программы КОМАГМАТ-5, которая отвечает 88% кристаллизации примитивного ортокумулата DV30-2 при температуре 1125°C и содержании в системе 0.13 мас.% сульфида.

Арискин и др. “Петрология, геохимия и происхождение сульфидоносных и ЭПГ-минерализованных троктолитов из зоны Конникова в Йоко-Довыренском расслоенном интрузиве”




Рис. 10. Концентрации халькогенов, платиноидов, Ag и Au в сульфидных фазах из пикродолерита и изученных троктолитов

Данные LA-ICP-MS анализов для пикродолерита DV30-1 (Ariskin et al., 2018c), троктолитов с рассеянными (07DV403-1, D8/15, D12/15, 13DV554-1-3 и -12) и пегматоидными (13DV551-4) сульфидами.

Арискин и др. “Петрология, геохимия и происхождение сульфидоносных и ЭПГ-минерализованных троктолитов из зоны Конникова в Йоко-Довыренском расслоенном интрузиве”




Рис. 11. Концентрации халькогенов, платиноидов и серебра в зависимости от родия в пентландите из пикродолерита и изученных троктолитов

Обозначения те же, что на рис. 9. Данные LA-ICP-MS анализов из табл. 6. Размах цветных линий отвечает стандартным отклонениям (1σ).

Арискин и др. “Петрология, геохимия и происхождение сульфидоносных и ЭПГ-минерализованных троктолитов из зоны Конникова в Йоко-Довыренском расслоенном интрузиве”




Рис. 12. Нормированные концентрации легких платиноидов, Au и Cu в зависимости от нормированного содержания теллура

Обозначения те же, что на рис. 9. Нормировка проводилась путем пересчета валовых концентраций элементов на 100% сульфидной массы в породе, при этом исходный сульфид (красная звездочка) представляет оценку состава наиболее примитивной сульфидной жидкости, полученную по результатам моделирования при помощи программы КОМАГМАТ-5 (Ariskin et al., 2018ac).

Арискин и др. “Петрология, геохимия и происхождение сульфидоносных и ЭПГ-минерализованных троктолитов из зоны Конникова в Йоко-Довыренском расслоенном интрузиве”












Рис. 13. Гетерофазовое выделение фрудита и ЭПГ-содержащего теллура на границе пирротина и кубанита в пегматоидном сульфиде.





Арискин и др. “Петрология, геохимия и происхождение сульфидоносных и ЭПГ-минерализованных троктолитов из зоны Конникова в Йоко-Довыренском расслоенном интрузиве”





































Пентландит




Халькопирит



Пирротин/Троилит








Кубанит



Концентрация, ppb

Концентрация, ppb





Po

Cub

Po

Фрудит

ЭПГ-содержащий
теллур

10 μm 0491

