ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЙ РУДОГЕНЕЗ ЯПОНСКОГО МОРЯ

Н.В. Астахова

*Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичёва ДВО РАН,
690041, Владивосток, ул. Балтийская, 43, Россия*

Японское море относится к тектонически-активному региону планеты с развитыми процессами рифтогенной деструкции земной коры и большим количеством вулканических построек на морском дне. В многочисленных экспедициях ТОИ ДВО РАН начиная с 70-х годов прошлого века до настоящего времени были обнаружены многочисленные участки железомарганцевых (ЖМО), фосфоритовых и баритовых рудопроявлений. Анализ распределения этих рудопроявлений показал, что все они тяготеют к тектонически-активным участкам морского дна: подводным вулканам, тектоническим уступам или зонам разломов. Причем на некоторых участках совместно встречаются фосфориты и ЖМО, а на одном — фосфориты, бариты и ЖМО. В базальтах, слагающих подводные вулканические возвышенности Японского моря, обнаружено выполнение пор железомарганцевыми гидроксидами, фосфоритами или баритами.

Эти данные позволяют говорить о том, что источниками рудного вещества во всех случаях являются поствулканические газогидротермальные флюиды или гидротермальные растворы, циркулирующие по зонам глубинных разломов во время деструкции континентальной коры в южных и восточных частях моря. Следовательно, железомарганцевые, фосфатные и баритовые рудопроявления в Японском море связаны с низкотемпературными гидротермально-осадочными процессами.

Железомарганцевые образования, фосфориты, бариты, Японское море

HYDROTHERMAL ORE GENESIS IN THE SEA OF JAPAN

N.V. Astakhova

The Sea of Japan is a tectonically active region with rift-related destruction of the Earth's crust and numerous volcanic edifices on the seafloor. Since the 1970s, numerous zones with ferromanganese crusts (FMCs) and phosphorite and barite ore occurrences have been discovered during the repeated expeditions of the Pacific Oceanological Institute, Vladivostok. Analysis of the distribution of these ore occurrences showed that all of them are confined to tectonically active zones of the seafloor: submarine volcanoes, tectonic scarps, or fault zones. In some zones, phosphorites occur together with FMCs, and in one zone, together with FMCs and barites. Ferromanganese hydroxides, phosphorites, or barites are found in the pores of basalts composing submarine volcanic edifices in the Sea of Japan.

These data indicate that the ore matter in all zones is supplied with postvolcanic gas-hydrothermal fluids or hydrothermal solutions circulating along deep faults during the destruction of the continental crust in the southern and eastern parts of the sea. Thus, ferromanganese, phosphate, and barite ore occurrences in the Sea of Japan are related to low-temperature hydrothermal-sedimentary processes.

Ferromanganese crusts, phosphorites, barites, Sea of Japan

ВВЕДЕНИЕ

Японское море входит в систему окраинных морей по азиатской периферии Тихого океана и располагается в зоне перехода земной коры Тихого океана к континентальной коре азиатского континента. Как и другие окраинные моря северо-востока Азии, оно относится к тектонически-активному региону планеты с развитыми процессами рифтогенной деструкции земной коры и большим количеством вулканических построек на морском дне. Большую часть площади моря занимают глубоководные котловины: Японская (Центральная) на западе, Ямато (Хонсю) на юго-востоке и Цусимская на юге (рис. 1). Максимальная глубина впадин — 3700, 2500 и 2000 м соответственно. Поверхность дна котловины ровная с отдельными возвышенностями (короткие хребты меридионального простирания, одиночные и сложно построенные вулканические конусы) высотой до 2 км. Длина их обычно не превышает первые десятки километров. Все возвышенности сложены различными по уровню кремнезема (от базальтов до трахириолитов) вулканическими породами среднемиоцен-плейстоценового возраста, которые являются производными одной базальтовой магмы [Съедин, 1987б; Емельянова, Леликов, 2010].

Рис. 1. Карта рудопроявлений Японского моря.

1 — железомарганцевые образования; 2 — фосфориты; 3 — бариты.

Юго-восточная и восточная окраины моря относятся к типу бордерленда. Докайнозойский консолидированный фундамент и палеоген-миоценовые вулканогенные толщи здесь разбиты многочисленными разломами, создавшими систему грабенов и горстов. Грабены часто заполнены осадками. Горсты образуют банки, острова и подводные валы. Вся эта сложная структура наклонена в сторону глубоководных котловин и впадин [Берсенеv и др., 1987].

В центральной части моря находится самая крупная подводная возвышенность Ямато. Системой грабенов она разделена на хребты Северное Ямато, Южное Ямато и возвышенность Такуе. Длина Северного Ямато порядка 250 км, Южного Ямато — 350 км, Такуе — 225 км. Максимальная ширина 100, 75 и 70 км соответственно, а минимальная глубина 500 м. Южнее ее находятся крупные возвышенности Кита-Оки, банка Оки, хр. Оки, на юго-западе — Криштафовича, на западе — Восточно-Корейская. Последняя по очертаниям напоминает дугообразную форму материкового склона. Эти возвышенности имеют земную кору субматерикового типа [Берсенеv и др., 1987].

В экспедициях отдела геологии и геофизики ТОИ ДВО РАН начиная с 70-х годов прошлого века до настоящего времени при проведении геологического опробования на морском дне были обнаружены многочисленные участки аутигенного рудообразования: железомарганцевого, фосфатного и баритового. В данной работе будут обобщены данные по рудогенезу этого региона.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Материалом для исследования послужили рудные образцы из коллекции отдела морской геологии и геофизики ТОИ ДВО РАН. К сожалению, часть образцов железомарганцевых корок, поднятых в экспедициях 70—80-х гг. прошлого века, была утеряна, поэтому для составления карты рудопроявле-

ний на дне Японского моря использовались данные драгирования из отчетов морских экспедиций на НИС «Первенец».

Определение породообразующих элементов в баритах и фосфоритах производилось методом «мокрой химии» в ТОИ ДВО РАН. Для определения содержания Fe, Mn, Si, Al, Ca, Mg, Ti и микроэлементов в составе ЖМК применялся атомно-эмиссионный (с индуктивно связанной плазмой) метод анализа на спектрометре Agilent 7500с (Agilent Technologies, США) в ДВГИ ДВО РАН. Все определения элементов выполнялись в навеске анализируемого вещества, высушенной при 105 °С. Для более детального изучения были изготовлены аншлифы ЖМК, которые изучали в ДВГИ ДВО РАН на микрозондовом анализаторе JXA-8100 (JEOL Ltd., Япония) с тремя волновыми спектрометрами, доукомплектованном энергодисперсионным спектрометром INCAx-sight (Oxford Instruments Analytical Ltd., Англия). Анализ осуществлялся при ускоряющем напряжении 20 кВ, угол отбора излучения составлял 45°. При анализе образцов на микрозонде содержания элементов рассчитываются из интенсивностей их характеристических рентгеновских линий. При сравнении интенсивностей и расчете содержаний элементов используется библиотека стандартов, данные которой обновляются не реже одного раза в квартал, а калибровка прибора проводится ежедневно. Расчет состава анализируемого образца проводится по программным комплексам, поставляемым вместе с прибором. Для проведения исследований образцы напылялись тонким слоем углерода. Объем области, в которой производилось определение химического состава, принимался в среднем как имеющий грушевидную форму с максимальным измерением 3—4 мкм. Количественный и полуколичественный анализ проводился по процедуре PhyRoZ, включенной в стандартную программу энергодисперсионного анализатора Link ISIS.

Минеральный состав образцов определялся рентгеноспектральным и ИК-спектральным анализами.

ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Железомарганцевые образования (ЖМО) в Японском море были обнаружены в первых же морских экспедициях на НИС «Первенец» отдела морской геологии ТОИ ДВО РАН. Впервые они были описаны И.К. Пушиным с соавторами, Л.М. Грамм-Осиповым и М.А. Репечка в 1975 г. [Грамм-Осипов, Репечка, 1975; Пущин и др., 1975]. К настоящему времени в экспедициях ТОИ ДВО РАН обнаружено уже 37 районов развития железомарганцевого рудообразования (см. рис. 1). ЖМО Японского моря представлены в основном корками мощностью от нескольких миллиметров до 35 см, реже конгломератами (рис. 2, а, б) или жерловыми брекчиями, «пропитанными» гидроксидами Fe и Mn, которые составляют до половины общего объема породы [Пущин и др., 1975; Астахова, Введенская, 2003; Астахова и др., 2015а; и др.]. Рудные корки поднимали при драгировании привершинных частей вулканических возвышенностей, реже крутых (тектонических) уступов на склонах рифтовых долин.

Образование железомарганцевых корок Японского моря связано с гидротермально-осадочным процессом. На это указывает приуроченность их к привершинным частям подводных вулканических построек, особенности химического состава и заполнение пор подстилающих базальтов гидроксидами марганца [Скорнякова и др., 1987; Астахова, Введенская, 2003; Астахова и др., 2010, 2014; Батурин, 2012; и др.]. Основными породообразующими минералами марганца являются тодорокит и бернессит, реже пиролюзит [Скорнякова и др., 1987; Можеровский и др., 1989; Батурин, 2012; Михайлик и др., 2014; Астахова и др., 2015б; и др.]. Кроме железомарганцевых встречаются железокремнистые корки с незначительным содержанием марганца. Они образовались в результате цементации кремнеземом мелких, бесформенных обломков железистых силикатов, часто представленных селадонитом, которые содержат включения оксидов или сульфидов железа. Эти корки очень пористые. Некоторые поры и поверхность корок частично или полностью заполнены гидроксидами железа и марганца или марганца с примесью бария до 5 % [Астахова и др., 2019]. Это указывает на осаждение марганца из растворов в последнюю стадию формирования этого типа ЖМО. При драгировании большинства подводных возвышенностей Японского моря поднимают ЖМО, относящиеся к разным группам. Это связано с тем, что при геологическом опробовании подводных возвышенностей драга протягивается по склону несколько сотен метров. В результате в драгу попадают обломки пород с разных участков склона, т. е. в одной драге могут находиться ЖМО, отобранные на разном расстоянии от гидротермального источника [Астахова, 2018].

Главными элементами в ЖМО Японского моря являются марганец, железо и кремний (рис. 3, а). Содержание их варьирует в широких пределах: Mn от 0.18 до 63.06 %, Fe — от 0.01 до 42.54 %, Si от 0.36 до 38 %. Соответственно, значения Mn/Fe меняются от 0.01 до 9016. Причем эти значения существенно различаются не только в образцах, отобранных на разных участках развития железомарганцевой минерализации, но и поднятых на одной станции. Например, в ЖМО безымянной возвышенности отношение Mn/Fe изменяется от 0.87 до 9016, среднее по 12 анализам — 1761 [Астахова, Лопатников, 2016]. В таблице 1 приведены данные по среднему химическому составу двух групп ЖМО, разделен-

Рис. 2. Руды Японского моря.

a, б — ЖМО: железомарганцевая корка возвышенности Беляевского (*a*) и конгломерат с марганцевым цементом с возвышенности Витязя (*б*); *в* — фосфорит Восточно-Корейской возвышенности; *г–е* — баритовые конкреции: банки Косидзи, бордерленд о. Хонсю, уменьш. 3; (*г*), хр. Окусири $\times 2$ (*д*) и возвышенности Северное Ямато, уменьш. 5 (*е*).

ных по соотношению Mn/Fe больше или меньше единицы. В первой группе (Mn/Fe >1) медианные значения Mn, Fe и Si составляют 38.61, 4.00 и 5.40 %, во второй — 3.06, 15.20 и 24.49 % соответственно. В ЖМО первой группы значительно выше содержание большинства микроэлементов: Ba, Sr, Co, Ni, V, Zn, Mo, Li, W (см. табл. 1).

Концентрация микроэлементов в ЖМО составляет десятые или сотые доли процента (см. табл. 1). Исключение составляет барий, содержание которого может достигать до 3 %. Высокое содержание бария связано с обогащением им отдельных участков марганцевой матрицы и выделениями барита внутри рудных корок [Астахова, 2019]. Значение суммы Ni, Co, Cu варьирует от 50 до 3323 г/т, составляя в среднем 970 г/т. Максимальные значения Ni, Co и Cu достигают 0.24, 0.20 и 0.23 % соответственно. Распределения этих элементов неравномерно как в образцах, отобранных на разных возвышенностях, так и в пределах одной станции. Так, например, в образцах ЖМО возвышенности Первенца содержание никеля меняется от 649 до 2432 г/т, на возвышенности Витязь кобальта — от 74 до 2033 г/т, а на вулкане на северном окончании возвышенности Южное Ямато меди — от 10 до 2340 г/т [Астахова, Введенская, 2003; Астахова и др., 2015а, б]. Среди других микроэлементов относительно высокие значения у стронция, реже у молибдена, у остальных — до несколько сотен г/т (см. табл. 1).

При нанесении данных на классическую треугольную диаграмму Fe—Mn—(Ni + Co + Cu)·10, разделяющую железомарганцевые образования на гидротермальные и гидротермальные, выявляется, что они размещаются в основании диаграммы (см. рис. 3, б), что, согласно [Bonatti et al., 1972], характеризует существенно гидротермальный источник вещества, участвовавшего в железомарганцевом рудообразовании на подводных возвышенностях Японского моря. Исключение составляют лишь тонкие 2–3-миллиметровые корки на поверхности слабоуплотненной глинистой породы, отобранные у подножия вулканической постройки на севере возвышенности Южное Ямато. При этом корки, поднятые при драгировании привершинной части этой постройки, попадают в область гидротермальных образований.

Рис. 3. Состав ЖМО (%) Японского моря на диаграммах Fe—Mn—Si (а) и Fe—Mn—(Ni + Co + Cu)·10 [Bonatti et al., 1972] (б).

ЖМО Японского моря имеют неоднородное строение. При микрозондовом изучении аншлифов ЖМО обнаружены участки марганцевого, железокремнистого, марганцево-кремнистого, железомарганцевого, марганцево-железокремнистого и кремнистого составов. Преобладающими являются отложения марганцевого и железокремнистого составов. Участки с разным химическим составом выделяются в форме полос с изменяющейся мощностью или в виде пятен различной формы. Границы между ними довольно четкие. Повсеместно в матрицах разного состава отмечается присутствие натрия, магния, калия, кальция, часто алюминия, бария и хлора, изредка фтора, фосфора и серы, а в единичных случаях, никеля, кобальта, свинца, молибдена, вольфрама, хрома и стронция. Во всех образцах в разных количествах обнаружены включения барита, магнетита, титаномагнетита, ильменита, пирита и других минералов, а также очень мелкие зерна самородных металлов, интерметаллических соединений, сульфидов, сульфатов, оксидов, фосфидов цветных и благородных металлов [Астахова, 2013].

Вулканические породы подводных возвышенностей Японского моря также содержат многочисленные включения металлов (Cu, Zn, Sn, Ni, Pb, As, Sb, W, Ta, Ti, Cr, Fe, Ag) в самородном виде, в форме интерметаллических соединений, фосфидов, силицидов (?), оксихлоридов (?), оксидов, сульфидов, сульфатов, вольфраматов. Кроме высокотемпературных минеральных фаз в магматических породах обнаружены многочисленные вторичные низкотемпературные минералы: оксиды железа, марганца, кремния или их смеси, а также галит, барит и сложные алюможелезистые силикаты. Особенности состава, локализации (микротрещины, микропустоты и т.д.), морфология и размеры выделений минеральных фаз свидетельствуют о формировании в результате наложенного поствулканического гидротермального процесса. Подтверждением наложенного характера процесса является совместное нахождение в одних и тех же полостях высоко-, средне- и низкотемпературных минеральных фаз. Причем последние первичны по отношению к металлическим минеральным фазам [Астахова и др., 2014].

Вулканизм на подводных возвышенностях Японского моря имел длительный и пульсирующий характер. Он периодически возобновлялся в течение продолжительного времени начиная со среднего миоцена. Все это обусловило масштабность и долговременность поствулканических гидротермальных процессов. По ослабленным трещиноватым зонам растворы пронизывали все слагающие возвышенности породы, но максимально их действие проявилось в наиболее проницаемой (прижерловой) части морфоструктур. В результате в привершинных частях вулканических построек произошло образование железомарганцевых корок, содержащих включения зерен акцессорных металлов. Учитывая, что подстилающие вулканические породы, как и ЖМО, наиболее обогащены никелем и кобальтом, можно сделать вывод, что они являются основным источником цветных металлов. В то же время часть акцессорных металлов попадают в гидротермальный раствор при выщелачивании сульфидов, отложившихся на более низких горизонтах, а высокотемпературные соединения, фосфиды и интерметаллы могли переноситься в твердой фазе с восходящими потоками магматических высокотемпературных рудоносных флюидов [Астахова, 2018].

Таблица 1.

Средний химический состав ЖМО Японского моря

Элемент	Mn/Fe > 1					Mn/Fe < 1				
	Количество проб	Среднее	Минимум	Максимум	Станд. откл.	Количество проб	Среднее	Минимум	Максимум	Станд. откл.
Fe, мас. %	66	4.00	0.01	15.45	4.26	14	15.20	5.38	42.54	10.51
Mn	66	38.61	12.60	63.06	15.19	14	3.06	0.18	16.84	4.50
Si	51	5.40	0.36	20.83	5.29	13	24.49	7.81	38.00	9.07
Al	58	0.97	0.03	4.10	0.91	13	1.89	0.01	8.82	3.19
Ti	56	0.07	0.003	0.89	0.16	14	0.16	0.001	0.95	0.33
P	28	0.09	0.01	0.25	0.06	7	0.10	0.01	0.26	0.10
Ba, г/т	49	7114	110	29667	6512	13	601	38	2328	754
Co	66	300	10	2033	345	14	50	3	143	50
Cr	58	25	0.4	130	25	13	55	2	213	81
Cu	66	201	7	1500	250	14	208	3	2340	615
Ni	66	589	41	2432	486	14	128	27	437	104
Pb	49	32	1	508	78	13	54	2	395	110
Sr	49	1294	480	2898	552	13	167	7	589	152
V	42	345	44	1624	300	12	107	6	388	110
Zn	59	232	24	610	151	14	104	7	286	90
Zr	41	37	1	312	58	12	42	1	122	46
Mo	54	309	86	1730	277	10	56	3	209	72
Li	53	238	4	902	287	9	29	9	55	17
As	36	45	17	78	16	8	78	4	251	87
Rb	36	20	0.4	91	21	8	76	18	156	56
W	36	96	3	427	93	8	16	2	89	30
U	35	9	0.3	21	6	8	4	0.5	15	5
(Ni+Co+Cu)·10	66	1.09	0.07	3.32	0.77	14	0.39	0.05	2.43	0.61
Mn/Fe	66	405	1.1	9016	1534	14	0.28	0.01	0.90	0.32
(Fe+Mn)/Ti	59	3535	25	22479	4236	14	4582	11	21443	6304

Примечание. Анализы выполнены атомно-эмиссионным (с индуктивно связанной плазмой) методом на спектрометре Agilent 7500c (Agilent Technologies, США) в Центре коллективного пользования ДВГИ ДВО РАН.

ФОСФОРИТЫ

Под фосфоритом понимается фосфорсодержащая горная порода, количество P_2O_5 в которой не менее 5 %. Впервые фосфориты в Японском море были обнаружены М.И. Липкиной в 1979 г. при ревизии каменного материала, поднятого при драгировании подводного влк. Ченцова на восточном краю Восточно-Корейской подводной возвышенности [Липкина, Школьник, 1981]. Позже были подняты фосфориты при драгировании возвышенностей Северное и Южное Ямато, Шевалдина, Криштофовича, Уллындо, Хакусан-Се, безымянной, хр. Оки и с материкового склона Приморья (см. рис. 1) [Берснев и др., 1982; Гусев, 1986; Липкина, Цой, 1999; и др.] в многочисленных экспедициях ТОИ ДВО РАН в 70–80-х годах прошлого века.

По материалам драгирования выделяются три основных типа фосфоритов Японского моря: фосфатизированные диатомиты, фосфатные желваки и псаммитопсефитовые породы с фосфатизированным цементом [Берснев и др., 1983; Гусев, 1986; Леликов, 2001].

Фосфатизированные диатомиты имеют самое широкое распространение. Они обнаружены на всех крупных подводных возвышенностях и ряде вулканических построек. Среди них выделяются массивные и слабоконсолидированные разности. Массивные фосфориты подняты в виде обломков остроугольной формы с раковистым изломом (см. рис. 2, в), иногда плитчатой формы. Размер обломков от 2–3 до 32 см. Это твердые, с высоким удельным весом (2.84–2.86 г/см³), массивные, иногда тонкослоистые или брекчевидные породы от светло-коричневого до темно-коричневого цвета, с небольшими пустотами, выполненными рыхлым фосфатным материалом. На крупных обломках на одной из сторон обычно имеется очень характерная черная, блестящая, «почковидная» поверхность. На возвышенности

Северное Ямато была поднята глыба базальта с коркой фосфорита, имеющего такую же поверхность. При высыхании породы корка отделилась от базальта.

Образцы фосфорита на 75—80 % сложены светло-желтым изотропным фосфатом, содержащим неравномерную примесь тонкоалевритовых терригенных частиц и аутигенные минералы: кристаллы барита, глауконит, пирит-мельниковит, гидроксиды железа и марганца. Результаты микроскопического, рентгеноструктурного, ИК-спектрального, термогравиметрического анализов с учетом химического состава позволяют отнести эти фосфориты к фторкарбонатапатиту (франколиту) [Берсенеv и др., 1983].

Слабоконсолидированные фосфориты установлены только на Восточно-Корейской возвышенности. Это рыхлые с небольшим удельным весом ($1.89—2.11 \text{ г/см}^3$) породы светло-бежевого цвета. Часто в образцах наблюдаются постепенные переходы от твердых фосфоритов центральной части образца к слабоконсолидированным разностям краевых частей глыб. Содержание P_2O_5 в обоих типах фосфатизированных диатомитов практически одинаково — от 20 до 30 %.

Фосфатные желваки уплощенные, «лепешковидные», в плане округлые и иногда неправильные. Размер от 1×5 до $(2—5) \times 20$ см. Поверхность неровная, шероховатая без признаков окатанности. Цвет серый, темно-серый, в изломе да черного. Тонкая параллельная слоистость огибает центр — ядро. Последнее округлой формы состоит из коричневого фосфата, иногда замещающего скопления диатомей, и постоянно содержит обломки костей, фосфатизированные фораминиферы, раковины. Периферическая зона сложена фосфатизированными раковинами диатомовых. Содержание P_2O_5 — 27—30 %. Они встречаются преимущественно на возвышенностях Северное и Южное Ямато и изредка на Восточно-Корейской.

В кремнисто-карбонатных конкрециях с материкового склона Приморья диаметром от 5 до 40 см, в ядрах которых встречаются кости позвоночных животных, а периферические зоны сложены терригенно-карбонатным фосфатизированным материалом, содержание фосфора значительно меньше (10—12 % P_2O_5).

Псаммитопсефитовые породы с фосфатизированным цементом характеризуются низким содержанием P_2O_5 (3—10 %). Они представляют собой обломки от неравномерно-обломочных грубых песчаников до мелкогалечниковых конгломератов размером до 5×10 см. Терригенный материал, составляющий более 50 % объема, представлен хорошо окатанными гальками гранитоидов, кислых и средних эффузивов, редко фосфоритами, а также зернами кварца, полевых шпатов, глауконита и погружен в базальный цемент из массы фосфатизированных диатомей. Встречаются на возвышенностях Ямато и изредка Восточно-Корейской и хр. Оки.

Все находки фосфоритов приурочены к базальным горизонтам морских неогеновых отложений. Последние несогласно перекрывают породы докайнозойского консолидированного фундамента и палеоген-раннемиоценовые базальтоиды. Имеющиеся определения возраста фосфоритов свидетельствуют, что они формировались в позднемиоценовых осадках, отлагающихся в ранний (Восточно-Корейская возвышенность), средний (возвышенность Уллындо, хребет и банка Оки) и поздний (возвышенность Северное Ямато) периоды этой эпохи. Фосфориты найдены преимущественно на склонах подводных возвышенностей в интервале глубин 1150—2150 м. Исключение составляет незначительное количество фосфоритов с низким содержанием P_2O_5 , поднятых при драгировании материкового склона Приморья в интервале 450—600 м и хр. Оки (гл. 330 м) [Берсенеv и др., 1983; Леликов, 2001].

Средний химический состав фосфоритов приведен в табл. 2. Во всех пробах, где определялся фтор, отмечается его высокое содержание (1.29—3.30 %).

В 80-х годах прошлого века в нескольких экспедициях ТОИ ДВО РАН проводилось целенаправленное изучение фосфоритов Японского моря. Наиболее детально был изучен участок на Восточно-Корейской возвышенности, где было сделано более 150 станций драгирования, отобраны колонки донных осадков и выполнено непрерывное сейсмопрофилирование. Участок имеет округлую форму диаметром 3.5 км и находится в интервале глубин 1300—2200 м на крутом северо-восточном склоне влк. Ченцова на восточном борту центральной части возвышенности. Фосфориты на этом участке представлены в основном твердыми фосфатизированными диатомитами, реже слабоконсолидированными. Отмечаются единичные находки желваков и конкреций [Леликов, 2001].

Вопрос о происхождении фосфоритов Японского моря окончательно не решен. Существуют две прямо противоположные точки зрения на их образование.

По мнению В.В. Гусева [1986], придерживающегося биохимической теории их образования, источником фосфора могли быть холодные воды течения палео-Ойясио, поступающие в период похолодания в среднем миоцене из Тихого океана. В поверхностном слое в холодных водах в зоне современного этого течения наблюдаются максимальные для Тихого океана содержания растворенного органического фосфора [Батурич, 2012]. На крупных возвышенностях в этот период преобладали шельфовые условия с высокой биопродуктивностью, благоприятные для формирования органогенных осадков с высоким содержанием фосфора в иловых водах.

Таблица 2.

Средний химический состав фосфоритов Японского моря, %

Элемент	Кол-во проб	Среднее	Минимум	Максимум	Станд. откл.
P ₂ O ₅	45	25.96	2.87	30.64	6.12
SiO ₂	36	11.31	1.22	47.30	12.19
TiO ₂	36	0.15	0.03	1.37	0.24
Al ₂ O ₃	40	2.38	0.67	10.81	2.09
Fe ₂ O ₃	40	2.81	1.20	9.80	1.56
FeO	13	0.45	0.04	2.87	0.74
MnO	26	0.15	0.02	1.22	0.27
MgO	40	2.10	0.76	4.61	0.93
CaO	36	40.16	11.95	46.97	9.24
Na ₂ O	25	1.24	0.50	2.86	0.65
K ₂ O	25	1.12	0.23	2.92	0.82
CO ₂	40	3.95	0.40	6.58	1.14
П.п.п.	26	10.68	6.06	14.29	1.79
F	30	2.15	0.30	3.34	0.70

Примечание. Данные химического состава фосфоритов взяты из работ [Берсенева и др., 1983; Леликов, 2001].

Другие исследователи связывают фосфатообразование в Японском море с кайнозойским вулканизмом [Липкина, Школьник, 1981; Гнидаш и др., 1988; Гнидаш, Съедин, 1991; Липкина, 1998]. На это указывают приуроченность районов развития фосфоритообразования к подводным вулканическим возвышенностям и высокое содержание P₂O₅ (0.1—1.7 %) в базальтах Японского моря. О гидротермальном поступлении фосфора свидетельствуют выполнение пор в туфах базальтов вторичными минералами, где наряду с калиевыми железистыми слоистыми силикатами находятся кристаллы фторкарбонатапатита. Авторы считают, что накопление фосфора, вероятно, происходило в результате постмагматических процессов. Он не только отлагался в виде вторичных минералов в измененных участках пород, но и поступал в морскую воду в составе гидротерм и мог мигрировать и отлагаться вдали от источника.

Наиболее вероятно предположение о гидротермальном поступлении фосфора. В частности, самый большой участок рудопроявления фосфоритов на Восточно-Корейской возвышенности сложен вулканическими породами, миоценовыми и голоценовыми отложениями. Распространенный в этом районе комплекс пород сформировался в сильно эродированном кратере или кальдере вулкана. Здесь локально распространена ограниченная ассоциация геологических образований: базальты, базальтовые туфы, пемзовые туфы, слабоцементированные осадочные отложения, гравийно-галечный материал четвертичного ледового разноса, фосфориты, кварцево-глауконитовые породы (железосиликатные корки), железомарганцевые корки [Съедин, 1987а]. Вулканические породы фосфатизированы и глауконитизированы. Содержание P₂O₅ в них варьирует от 0.46 до 10.78 %. Франколит встречается в кавернах, порах и трещинах базальтов, в цементе туфов в парагенезисе с глауконитом и пиритом. В некоторых образцах базальтов в порах встречаются микродрозы белых кристаллов барита [Липкина, 1998].

О гидротермальной деятельности на влк. Ченцова также свидетельствует колонка донных осадков длиной 238 см, поднятая трубкой в его кальдере с глубины 1800 м. Она представлена миоценовыми отложениями, перекрытыми 7-миллиметровым слоем эдафогенных осадков, предположительно голоценового возраста. Разрез миоцена на всю мощность пронизан многочисленными современными студнеобразными интенсивно пиритизированными зелеными глинами самой разнообразной формы. Они отчетливо выделяются по разрезу трубки и внешне напоминают жильные тела. Это извивающиеся тонкие жилки или устремленные вверх пунктирные, линзовидные тела. Пирит здесь представлен как хорошо ограниченными кубическими кристаллами, так и фрамбоидами. Также встречается барит и франколит. Фосфатная минерализация является наложенной. Франколитом избирательно замещена наиболее проницаемая часть разреза, обогащенная створками диатомей и глауконитом [Липкина, Пушкарь, 2001].

Образование кремнисто-карбонатных конкреций с материкового склона Приморья связано с диагенетическими процессами [Астахова и др., 1993]. Конкреции с небольшим (10—12 % P₂O₅) содержанием фосфора встречаются только в районе зал. Петра Великого. Так как в этот залив впадают многочисленные реки Южного Приморья, вероятнее всего, повышение содержания фосфора в осадке связано с выносом этих рек.

БАРИТ

В Японском море единичные кристаллы аутигенного барита встречаются довольно часто. Находки его приурочены в основном к отложениям миоценового возраста, поднятым со склонов подводных вулканов [Астахова, 1996]. Крупные скопления бария в виде баритовых конкреций обнаружены в миоценовых отложениях восточной и центральной частях моря: на банках бордерленда о. Хонсю, на юго-востоке возвышенности Северное Ямато, на западном склоне хр. Окусири у берегов Хоккайдо. В указанных районах находки баритовых конкреций приурочены к тектоническим нарушениям, ограничивающим эти структуры. В основном конкреции имеют шаровидную, эллипсоидную или уплощенную, лепешковидную форму. Реже встречаются субцилиндрические или неправильные формы. Но по внутреннему строению конкреции из различных районов Японского моря значительно различаются между собой. Наиболее простое строение имеют конкреции с бордерленда о. Хонсю, самое необычное — конкреции, поднятые при драгировании склона хр. Окусири (см. рис. 2, *з—е*).

Банки бордерленда о. Хонсю представляют собой платообразные возвышенности с минимальной глубиной от 200 до 400 м, разделенные трогами глубиной 800—1000 м. Впервые баритовые конкреции были обнаружены японскими геологами в конце 1960-х годов на банках Сингури, Торимигури, Окикамагури и в заливах Акита и Садо [Okada et al., 1971; Sakai, 1971]. В 1980 г. в экспедиции ТОИ ДВО РАН при драгировании склонов и вершинных еще пяти банок севернее о. Садо также были подняты баритовые конкреции [Астахова, Мельниченко, 2002]. Поднятые конкреции зеленовато-серого цвета имеют округлую, овальную, цилиндрическую или неправильную форму с максимальным размером 20×10×8 см (см. рис. 2, *з*) и округлым или овальным сечением. Поверхность конкреций ровная, серого цвета. Внутреннее строение одних конкреций однородное, у других выделяются центральная темно-серая часть и ряд концентрических слоев светло- и темно-серого цвета. Внутри некоторых конкреций отмечаются трещины синерезиса, выполненные кальцитом. В шлифах видно, что конкреции образованы мелкозернистым баритом (0.02—0.10 мм) с примесью радиолярий, диатомей и терригенных минералов. Содержание BaSO₄ в конкрециях варьирует от 62.69 до 84.84 %. Они встречаются в толще диатомовых аргиллитов, возраст которых конец среднего—начало позднего миоцена (10—8 млн лет) [Okada et al., 1971].

На возвышенности Северное Ямато при драгировании крутого уступа в юго-восточной части в интервале 1200—1300 м было поднято около 50 кг целых баритовых конкреций и их фрагментов. Баритовые конкреции имеют различную величину и форму: сферическую диаметром 3—7 см; лепешковидную, диаметром 4—7 см и толщиной 1.5—2.0 см; гантелеобразную длиной от 3 до 32 см с диаметром 1.5—7.0 см (см. рис. 2, *е*) [Липкина, Цой, 1980; Астахова, Мельниченко, 2002]. Поверхность конкреций неровная, бугорчатая, в большинстве случаев с одной стороны покрыта гидроксидами марганца. На некоторых конкрециях сохранился слой вмещающего осадка — диатомита. Комплекс диатомей характеризует верхний миоцен Северо-Тихоокеанской области [Липкина, Цой, 1980]. Внутреннее строение конкреций неравномерно-кристаллическое. У большинства конкреций примерно треть объема занимает внутреннее ядро, резко обособленное от внешней периферийной части. Ядро сложено лучистым крупнокристаллическим баритом зеленовато-белого или светло-розового цвета. Величина кристаллов барита в лучистых сростках достигает 1.2 см. Периферические части конкреций также сложены радиально-лучистым баритом, но кристаллы значительно меньше по размеру и различимы только под микроскопом. В этой зоне наблюдается примесь радиолярий и диатомей. Содержание BaSO₄ в центральной и периферийной частях конкреции составляет 98 и 74 % соответственно, в валовой пробе — 89.51 %.

Баритовые конкреции хр. Окусири были подняты при драгировании его западного склона на глубине 1560—1400 м [Астахова и др., 1990]. Они имеют шаровидную и эллипсоидальную форму. Поверхность их серого цвета, слегка шероховатая. На срезе шарообразной конкреции диаметром 4 см отчетливо выявляется зональное строение: темно-серое ядро и более светлая оторочка толщиной 0.5 см. Конкреция образована мелкозернистым баритом, в шлифе отмечаются большое количество диатомей разной сохранности и очень мелкие глобулы диагенетического пирита. Пирит развивается как по основной массе, так и по органическим остаткам.

Конкреции овальной формы с максимальным размером 6.0×2.5×2.0 см имеют необычное строение. Внешнюю часть их составляет слой серого мелкокристаллического барита шириной 2—3 мм, в раздувах до 6 мм. В центральной части конкреций прослеживается прослой барита черного цвета (плоскость, секущая конкрецию по длине) (см. рис. 2, *д*). В одних случаях он оканчивается во внешнем сером слое, в других — выходит за пределы конкреции. Толщина этого слоя колеблется от 1 до 5 мм. На старых сколах он охристый за счет гидроксидов железа. Пространство между оболочкой и черным прослоем заполнено диатомовым илом. По данным биостратиграфического анализа, комплекс диатомей этого ила аналогичен комплексу верхнемиоценовой зоны *Rouxia californica* (7.4—6.0 млн лет) [Астахова и др., 1990]. Можно предположить, что первоначально было образовано пластовое тело черного барита.

Затем, вероятно, в результате тектонических процессов оно было раздроблено на фрагменты, вокруг которых в осадке начался рост баритовых конкреций.

Рудная минерализация в баритовых конкрециях представлена сульфидом железа и распространена крайне неравномерно. В прожилке черного барита отмечаются единичные очень мелкие гнезда октаэдрических кристаллов сульфида. Основная часть рудного материала наблюдается в сером барите и приурочена к припрожилковым участкам. В количественном отношении значительно преобладают глобулы размером 2—3 мкм. Отмечаются единичные скопления, в каждом из которых присутствует по 6—10 глобул. Помимо этого пирит неравномерно замещает органические остатки, образуя при этом сетчатые, сотовидные текстуры.

Химический состав баритовых конкреций приведен в табл. 3. Кроме относительно высокого содержания железа, черный барит обогащен As, Cu, Co, Zn, Pb и Mo по сравнению с серым.

Образование маломощных пластовых тел барита в среднем миоцене вполне допустимо в этом районе. Подводный хр. Окусири начинается резко выраженным поднятием вблизи о. Окусири и протягивается отсюда к юго-западной части о. Хоккайдо [Геологическое развитие..., 1968], где ведется разработка стратиформного барит-полиметаллического месторождения (рудник Тойя 2) [Геохимия..., 1982]. Это месторождение типа Куроко приурочено к морским миоценовым отложениям [Мейнард, 1985].

Известно, что почти все барит-полиметаллические залежи руд Куроко располагаются на одном и том же стратиграфическом уровне и формировались в течение очень небольшого промежутка времени в конце стадии Нисикурсава в среднем миоцене. На это время приходится спад вулканической активности и максимальное прогибание коры. Именно в данный период в небольших впадинах рельефа дна, где циркуляция морских вод была ограниченной и не происходило размыва содержащих сульфиды осадков, сформировались несколько самостоятельных месторождений [Мейнард, 1985]. Но, вероятно,

Таблица 3. Химический состав баритовых конкреций Японского моря

Компонент	Возв. Ямато	Хр. Окусири							Банка Сингури	
	Вал. проба	Обр. 1		Обр. 2		Обр. 3			Обр. 1	Обр. 2
		Край	Центр	Край	Вал. проба	Край	Черный прожилок	Вал. проба		
BaO, мас. %	58.00	53.07	55.21	51.92	49.13	53.07	53.73	45.35	48.01	55.75
SO ₃	31.51	27.44	29.72	27.18	22.29	24.44	31.21	23.75	28.71	29.15
SiO ₂	0.36	10.00	5.50	7.31	14.90	10.19	0.24	15.34	н.а.	н.а.
TiO ₂	0.38	0.09	0.05	0.41	0.09	0.05	0.03	0.10	»	»
Al ₂ O ₃	1.27	1.64	1.82	2.60	3.00	2.90	1.55	2.90	»	»
Fe ₂ O ₃	1.57	0.64	0.67	1.20	1.47	1.12	4.10	2.39	0.60	1.17
MnO	0.44	0.07	0.14	1.25	0.17	0.11	0.11	0.17	0.02	0.03
MgO	1.99	1.05	1.05	1.15	1.47	0.84	0.73	1.47	н.а.	н.а.
CaO	1.72	1.29	1.50	1.07	1.50	1.72	1.50	1.72	0.07	0.06
Na ₂ O	0.08	0.12	0.14	0.25	0.32	0.32	0.03	0.39	н.а.	н.а.
K ₂ O	0.35	0.25	0.25	0.39	0.25	0.50	0.05	0.50	»	»
P ₂ O ₅	0.09	0.10	0.15	0.12	0.05	0.01	0.01	0.02	»	»
П.п.п.	0.96	2.08	1.48	2.76	3.40	2.64	6.12	4.56	»	»
St, г/т	10000	10000	10000	5000	10000	2000	2000	6000	4735	1183
Pb	10	5	8	10	20	6	60	10	186	186
Zn	30	н. о.	30	30	50	н. о.	60	50	н.а.	н.а.
Cu	10	20	20	20	30	30	50	50	»	»
Ag	н. о.	н. о.	н. о.	н. о.	н. о.	0.1	0.3	5	»	»
Ni	10	3	5	5	30	30	30	30	»	»
Co	3	н. о.	н. о.	н. о.	10	н. о.	20	н. о.	»	»
Mo	3	»	10	5	10	3	20	10	»	»
As	н. о.	»	н. о.	н. о.	н. о.	н. о.	1000	н. о.	»	»

Примечание. Анализы баритовых конкреций возвышенности Северное Ямато и хр. Окусири выполнены в ТОИ ДВО РАН методом «мокрой химии», аналитик И.Н. Якушева; определение микроэлементов — спектральным анализом в ЦЛ ПГО Примгеология. Данные по химическому составу конкреций банки Сингури взяты из работы [Okada et al., 1971]. н.а. — не анализировалось, н.о. — не определено.

часть гидротермальных растворов не выходила на поверхность дна, а растекалась в толще осадка, где смешивалась с иловыми водами. В результате реакции барийсодержащих растворов и сульфата иловых вод произошло постепенное образование баритовых конкреций.

Учитывая, что все находки баритовых конкреций в Японском море тяготеют к зонам глубинных разломов пояса Садо-Окусири и возвышенности Ямато, где в среднем миоцене отмечалась гидротермальная активность [Геологическое развитие..., 1968], можно принять источником бария гидротермальные растворы, поднимающиеся по этим разломам, но не выходящие на поверхность морского дна. Такой процесс наблюдается в настоящее время во впадине Дерюгина (Охотское море), где в осадке происходит образование тонких прожилков, мелких гнезд и микроконкреций барита [Астахова, Сорочинская, 2001]. В изученном районе хр. Окусири железобариевые и бариевые гидротермальные растворы поступали с перерывом по времени. При этом пластовые тела черного барита впоследствии были раздроблены более поздними тектоническими подвижками.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ распределения железомарганцевых, фосфоритовых и баритовых рудопроявлений в Японском море показал, что все они тяготеют к тектонически-активным участкам морского дна: подводным вулканам, к тектоническим уступам или к зонам разломов. Причем на некоторых вулканах, в частности, на возвышенности Шевалдина, в разное время были подняты фосфориты и маломощные марганцевые и железокремнистые корки, а на юго-западной части возвышенности Северное Ямато — фосфориты, бариты и железомарганцевые корки.

В составе ЖМО Японского моря присутствует барий и фосфор. Они могут обогащать отдельные участки рудной матрицы и/или находиться в виде включений зерен барита или фосфидов. Кроме этого, фосфор может входить в состав комплексных соединений сульфидов цветных металлов [Астахова, 2013, 2018, 2019]. В фосфоритах выявлены включения аутигенных кристаллов барита и содержание MnO до 0.87 % [Липкина, 1981; Леликов, 2001]. В базальтах, слагающих подводные вулканические возвышенности Японского моря, обнаружено выполнение пор железомарганцевыми гидроксидами, фосфоритами или баритами [Астахова и др., 2014; Липкина, 1998].

Эти данные позволяют говорить о том, что источниками рудного вещества во всех случаях являются поствулканические газогидротермальные флюиды или гидротермальные растворы, циркулирующие по зонам глубинных разломов во время деструкции континентальной коры в южных и восточных частях моря. Следовательно, железомарганцевые, фосфатные и баритовые рудопроявления в Японском море связаны с низкотемпературными гидротермально-осадочными процессами.

Работа выполнена по госбюджетной теме «Палеоокеанология окраинных морей Востока России и примыкающих районов Тихого океана, особенности и этапность кайнозойского осадконакопления, магматизма и рудогенеза» (№ АААА-А17-117030110033-0).

ЛИТЕРАТУРА

Астахова Н.В. Баритовая минерализация в осадках окраинных морей западной части Тихого океана // Тихоокеанская геология, 1996, т. 15, № 5, с. 103—109.

Астахова Н.В. Формы нахождения и особенности распределения благородных и цветных металлов в железомарганцевых корках Японского моря // Океанология, 2013, т. 53, № 6, с. 769—785.

Астахова Н.В. Железомарганцевые корки центральной котловины Японского моря // Литология и полезные ископаемые, 2018, № 5, с. 384—396.

Астахова Н.В. Барий в железомарганцевых образованиях Японского моря: особенности выделения и взаимоотношение с основными рудными фазами // Вестник ИГ КомиНЦ УрО РАН, 2019, № 3, с. 31—40, doi: 10.19110/2221-1381-2019-03-31-40.

Астахова Н.В., Сорочинская А.В. Баритовая и карбонатная минерализация в осадках впадины Дерюгина Охотского моря // Океанология, 2001, т. 41, № 3, с. 447—455.

Астахова Н.В., Мельниченко Ю.И. Баритовые конкреции Японского моря // Литология и полезные ископаемые, 2002, № 1, с. 44—52.

Астахова Н.В., Введенская И.А. Химический состав и генезис железомарганцевых образований подводных вулканов и возвышенностей Японского моря // Вулканология и сейсмология, 2003, № 6, с. 36—43.

Астахова Н.В., Лопатников Е.А. Состав и парагенетические ассоциации массивного пирролизита из глубоководной котловины Японского моря // Геология и геофизика, 2016, т. 57 (10), с. 1861—1874.

Астахова Н.В., Ожогина Е.Г., Цой И.Б. Баритовые конкреции северной части Японского моря // Тихоокеанская геология, 1990, т. 9, № 4, с. 16—21.

- Астахова Н.В., Ващенко Н.Г., Горбаренко С.А.** Карбонатные образования из неогеновых отложений материкового склона Приморья // Тихоокеанская геология, 1993, т. 12, № 1, с. 32—38.
- Астахова Н.В., Колесник О.Н., Съедин В.Т.** Цветные, благородные и редкоземельные металлы в железомарганцевых корках и базальтах возвышенности Беляевского (Японское море) // Вестник КРАУНЦ. Серия Науки о Земле, 2010, вып. 16, № 2, с. 152—166, http://www.kscnet.ru/kraesc/2010/2010_16/2010_16.html.
- Астахова Н.В., Колесник О.Н., Съедин В.Т.** Рудная минерализация в вулканических породах подводных возвышенностей Японского моря // Геохимия, 2014, № 2, с. 158—177.
- Астахова Н.В., Лопатников Е.А., Цой И.Б.** Геохимия марганцевых конгломератов возвышенности Витязя (Японское море) // Вулканология и сейсмология, 2015а, № 6, с. 13—23.
- Астахова Н.В., Съедин В.Т., Можеровский А.В., Лопатников Е.А.** Первая находка массивного пирролюзита в глубоководной котловине Японского моря // ДАН, 2015б, т. 462, № 1, с. 68—72.
- Астахова Н.В., Лопатников Е.А., Можеровский Ф.В., Ярошук Е.И.** Гидротермальные отложения возвышенности Первенца (Японское море) // Вулканология и сейсмология, 2019, № 4, с. 29—39, doi: <https://doi.org/10.31857/S0203-03062019429-39>.
- Батурин Г.Н.** Геохимия гидротермальных железомарганцевых корок Японского моря // ДАН, 2012, т. 445, № 2, с. 179—184.
- Берсенов И.И., Школьник Э.Л., Гусев В.В.** Фосфориты дна Японского моря // Докл. АН СССР, 1983, т. 271, № 2, с. 397—409.
- Берсенов И.И., Леликов Е.П., Безверхний В.Л., Ващенко Н.Г., Съедин В.Г., Терехова Е.П., Цой И.Б.** Геология дна Японского моря. Владивосток, ДВНЦ АН СССР, 1987, 140 с.
- Геологическое развитие Японских островов** / Под ред. М. Масао, Г. Масао, Ф. Мицуо. М., Мир, 1968, 720 с.
- Геохимия гидротермальных рудных месторождений** / Ред. Х.Л. Барнс. М., Мир, 1982, 624 с.
- Гнидаш М.И., Съедин В.Т.** О связи фосфатонакопления с подводным вулканизмом // Советская геология, 1991, № 10, с. 39—43.
- Гнидаш М.И., Съедин В.Т., Можеровский А.В., Якушева И.Н.** Геохимические ассоциации фосфора в базальтах Японского моря // Тихоокеанская геология, 1988, т. 7, № 3, с. 25—34.
- Грамм-Осипов Л.М., Репечка М.А.** Марганцевые корки на дне Японского моря // Океанология, 1975, т. 15, № 4, с. 672—674.
- Гусев В.В.** Фосфориты Японского моря. Состав и генезис: Автореф. дис.... к.г.-м.н. Новосибирск, 1986, 17 с.
- Емельянова Т.А., Леликов Е.П.** Миоцен-плейстоценовый вулканизм глубоководных котловин Японского и Охотского морей // Тихоокеанская геология, 2010, т. 29, № 2, с. 57—68.
- Леликов Е.П.** Геология фосфоритов дна Японского моря. Владивосток, Дальнаука, 2001, 117 с.
- Липкина М.И.** Фосфатная и сопутствующая минерализация в магматических породах подводного вулкана Ченцова (Японское море) // Тихоокеанская геология, 1998, т. 17, № 3, с. 81—93.
- Липкина М.И., Цой И.Б.** Конкреции барита с подводной возвышенности Ямато в Японском море // Докл. АН СССР, 1980, т. 254, № 4, с. 1002—1005.
- Липкина М.И., Школьник Э.Л.** Фосфориты с подводного вулкана Ченцова в Японском море // Докл. АН СССР, 1981, т. 257, № 1, с. 217—222.
- Липкина М.И., Цой И.Б.** О возрасте и генезисе фосфатной минерализации на Северном Ямато в Японском море // Тихоокеанская геология, 1999, т. 17, № 3, с. 81—93.
- Липкина М.И., Пушкарь В.С.** Стратифицированные гидротермальные фосфорит-глауконитовые отложения миоцена на ст. 2617-А с подводного вулкана Ченцова в Японском море // Геология морей и океанов. Тез. докл. XIV Международной школы морской геологии, М., ГЕОС, 2001, т. 1, с. 328—329.
- Мейнард Дж.Б.** Геохимия осадочных рудных месторождений. М., Мир, 1985, 358 с.
- Михайлик П.Е., Михайлик Е.В., Зарубина Н.В., Баринов Н.Н., Съедин В.Т., Леликов Е.П.** Вещественный состав и распределение РЗЭ в железомарганцевых корках подводных возвышенностей Беляевского и Медведева (Японское море) // Тихоокеанская геология, 2014, т. 33, № 5, с. 3—16.
- Можеровский А.В., Грамм-Осипов Л.М., Волкова Т.И., Можеровская Л.В.** Минералогические особенности железомарганцевых образований Японского моря // Новые данные по геологии западной части Тихого океана. Владивосток, ДВНЦ АН СССР, 1989, с. 135—139.
- Пушин И.К., Берсенов И.И., Берсенов Ю.И., Леликов Е.П., Терехов Е.П.** О находке железомарганцевых конкреций в северо-западной части Японского моря // Геология окраинных морей Тихого океана. Владивосток, ДВНЦ АН СССР, 1975, с. 94—95.

Скорнякова Н.С., Батулин Г.Н., Гурвич Е.Г., Успенская Т.Ю., Краснов С.Г., Гнидаш М.И. Железомарганцевые корки и конкреции Японского моря // Докл. АН СССР, 1987, т. 293, № 2, с. 430—434.

Сьедин В.Т. Особенности геологического строения фосфоритоносного участка Ченцова (Японское море) // Геология Тихого океана. Тез. докл. На III Тихоокеанской школе по морской геологии, геофизике и геохимии. Владивосток, ДВ НЦ АН СССР, 1987а, с. 85—89.

Сьедин В.Т. Формационно-геохимические типы кайнозойских базальтоидов Японского моря // Докл. АН СССР, 1987б, т. 296, № 6, с. 1441—1446.

Bonatti E., Honnorez J., Joensuu O., Rydell H. Classification and genesis of submarine iron manganese deposits / Ed. D.R. Horn // Ferromanganese deposits on the ocean floor. Washington, D.C., National Science Foundation, 1972, p. 149—166.

Okada K., Kato S., Kobayashi S.I. On barite nodule from the Sin Guri Bank, Japan Sea // J. Min. Metall. Inst. Jpn., 1971, v. 87, № 1002, p. 594—598.

Sakai H. Sulfur and oxygen isotopic study of barite concretions from banks in the Japan Sea of the North-east Honshu, Japan // Geochem. J., 1971, v. 5, № 2, p. 79—93.

*Поступила в редакцию 1 ноября 2019 г.,
подписана в печать 26 мая 2020 г.*